

CATÁLOGO **GANADERO**



Detrás de un animal sano,
estamos nosotros.

Virbac México, experto en salud animal. Nuestra misión es ofrecer una amplia gama de productos para potenciar la salud y el bienestar animal.

ANTIBIÓTICOS

ANTI
INFLAMATORIOS

ANTIPARASITARIOS

BIOLÓGICOS

INTRAMAMARIOS

NUTRICI^N_ALES

GANANCIA DE PESO



SUMMAActive

BI^oSEGURIDAD

11

ANTIBIOTICOS

12



Citius 5%

13



Curacef Duo

14



Diclofenil L.A.

15



Fortius L.A.

16



Maxflor Duo

17



Maxflor L.A.

18



Potencil

19



Shotadex

20



Shotapen
Classic

21



Shotapen L.A.

22



Tulissin 100

23



Veterralent
20% L.A.

MENU

24

ANTI INFLAMATORIOS

25



Arthridine

26



Megludyne

MENU

27

ANTI**PARASITARIOS**

28



Acatak
Pour on

29



Ectogan

30



Effipro Bovis

31



Equimax

32



Fortik 4

33



Imidogan

34



Oxfenil

35



Supermetrina
Pour-on

36



Virbamec F

37



Virbamec L.A.

38



Virbamec
Platinum

MENU

39

BIOLOGICOS



40



Bovigen
Lepto 8

41



Bovigen
Total SE

42



Clostrigen 9+T

43



Clostrigen P

44



Rabatvac
Bovis

MENU

45

INTRAMAMARIOS

46



Rilexine
200 NP

47



Rilexine
500

48



Rilexine
500 N

49



CLOXA 1000

MENU

50

NUTRICI^N_ALES

51



Fosfosan

52



Hepatonik

53



Phospho 20%

54



Proton 500

55



Ruminal Plus

56



Selenie

57



Vitafluid

MENU

58

GANANCIA DE PESO

59



Grofactor

60



Zeralon

61



Zeramec

62



Zeramec
Platinum

MENU

63



SUMMActive

64



CipioActive

65



DibActive 600-1200

66



Estroactive

67



**Gonactive
eCG**

68



InducelActive

69



LiberActive

MENU

70

BI^oSEGURIDAD

71



Alfadex Polvo
21.29

72



Alfadex CE
21.12

73



Avant Tapete
ULTRA

74



Avant ULTRA 5

75



Avanzar

76



Shampoo Germicida
Avant

77

Protocolos Reproductivos

MENU

| ANTIBIÓTICOS





MENU

REGRESAR



Suspensión antibiótica inyectable lista para usarse

**PRESENTACIÓN:**

Frasco con 100 ml y 250 ml.

**FÓRMULA**

Cada 1 ml contiene:

Ceftiofur (clorhidrato).....50 mg

Vehículo c.b.p.....1 ml

**INDICACIONES**

Antibiótico de amplio espectro para uso en porcinos y bovinos adultos.

Para el tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica* y *Histophilus somni*.

Como auxiliar en el tratamiento de Pododermatitis causado por *Fusobacterium necrophorum* asociado a *Bacteroides melanogenicus*.

Para el tratamiento de mastitis y metritis causadas por microorganismos sensibles al efecto de ceftiofur.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Bovinos (productores de carne y leche): Administrar 1 a 3 ml por cada 50 kg de peso (1 – 3 mg/kg de peso). Durante 3 a 5 días.

Porcinos: Administrar 1 a 3 ml por cada 50 kg de peso (1 – 3 mg/kg de peso). Durante 3 días.

Repetir cada 24 horas por 3 días o a recomendación del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

Bovinos: Intramuscular o subcutánea.

Porcinos: Intramuscular.

**ADVERTENCIAS**

Agite el producto antes de usar.

Periodo de retiro:

Porcinos: Carne 48 horas.

Bovinos: Carne 48 horas.

Leche cero horas*.

*Cero horas de retiro para los cuartos sanos en empresas que se rigen bajo las normas FDA.

Dos ordeños de retiro para las empresas que se rigen bajo el criterio "cero residuos".

- La leche de los cuartos enfermos deberá retirarse durante el tratamiento.

- Consérvese a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa.

- Una vez abierto, utilice la totalidad del contenido del envase dentro de un periodo de dos meses.

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

- Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

MENU

REGRESAR



Cefalosporina betalactámica de amplio espectro y Antiinflamatorio no esterooidal.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml y 250 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Ceftiofur clorhidrato.....53.5 mg
(Equivalente a 50.0 mg de ceftiofur base)
Ketoprofeno.....150 mg
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

Curacef® Duo está indicado en bovinos para el tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni* y *Pasteurella multocida*; tratamiento de necrobacilosis interdigital aguda causada por *Bacteroides melaninogenicus*, *Fusobacterium necrophorum* y *Fusobacterium nucleatum* y en infecciones reproductivas causadas por bacterias como *E. coli*, *Corynebacterium spp.* en la metritis puerperal o post parto, ya que son bacterias susceptibles a ceftiofur y asociadas con dolor y/o pirexia y/o inflamación.

Especie: Bovinos productores de carne y leche.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Enfermedades respiratorias: 1 ml/50 kg de peso por día durante 2 a 5 días consecutivos, equivalente a 1 mg ceftiofur/kg/día y 3 mg ketoprofeno/kg/día.

Si la inflamación cede después de 2 días de tratamiento, Curacef® Duo deberá sustituirse por un tratamiento a base de Ceftiofur clorhidrato, para completar el período de 3 a 5 días de antibioticoterapia.

Necrobacilosis interdigital aguda: 1 ml/50 kg de peso por día durante 3 días, equivalente a 1 mg/kg/día de ceftiofur y 3 mg de ketoprofeno/kg/día.

Metritis: 1 ml/50 kg de peso por día durante 3 a 5 días consecutivos, equivalente a 1 mg ceftiofur/kg/día y 3 mg ketoprofeno/kg/día.

Vía de Administración: Intramuscular exclusivamente.



ADVERTENCIAS

- Manténgase a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa, máximo 30°C.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Período de retiro: No destinar para consumo humano la carne de animales tratados hasta 8 días después de la última aplicación.
 - Curacef® Duo no tiene período de retiro en leche para problemas que no involucren la ubre.
 - Después de retirar la primera dosis desechar en 90 días.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Diclopenil L.A.

No. de Reg. Q-0042-364
USO VETERINARIO

MENU

REGRESAR



Antibiótico de amplio espectro con antiinflamatorio no esteroide en suspensión inyectable.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 15 ml.



FÓRMULA

Cada frasco ampola contiene:

Penicilina G Benzatínica.....3,000,000 UI

Penicilina G Procaínica.....1,000,000 UI

Penicilina G Potásica.....2,000,000 UI

Estreptomicina Sulfato.....2,500 mg

Cada frasco diluyente contiene:

Diclofenaco de sodio.....250 mg

Vehículo c.b.p.....15 ml



INDICACIONES

Para el tratamiento de bovinos productores de carne y leche, ovinos, porcinos y equinos en infecciones localizadas o sistémicas causadas por microorganismos Gram positivos y Gram negativos sensibles a la combinación penicilina-estreptomicina, que además cursen con una inflamación aguda o crónica del tejido afectado.

Diclopenil L.A., es eficaz contra *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Pasteurella spp*, *Salmonella spp*, *Clostridium spp*, *Corynebacterium spp*, *Fusobacterium necrophorum*, *Bordetella bronchiseptica*, *Actinobacillus spp*, *Leptospira spp*.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar 10,000 UI de penicilina/kg de peso por vía intramuscular, esta dosis equivale a 1 ml por cada 40 kg de peso bajo estrictas medidas de asepsia. Esta dosis puede repetirse a las 72 horas después de la primera aplicación.

Vía de Administración: Intramuscular.



ADVERTENCIAS

- No se recomienda la aplicación por vía endovenosa.
 - No se recomienda su uso en caninos y felinos.
 - No se utilice otro antiinflamatorio asociado a Diclopenil L.A.
 - Si la dosis excede de los 15 ml, debe administrarse en dos sitios diferentes.
 - No se consuma la leche de animales tratados con este producto durante y hasta 72 horas después del último tratamiento.
 - No tratar a los animales 30 días antes del sacrificio para consumo humano.
 - No administrar este producto a equinos destinados para consumo humano.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Consérvese en un lugar fresco y seco.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



MENU

REGRESAR



Solución antibiótica inyectable de larga acción

PRESENTACIÓN:

Frasco 100 ml y 250 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Enrofloxacin.....100 mg
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

Antibacteriano de amplio espectro para ser usado en bovinos (productores de carne y leche), ovinos, caprinos y porcinos.

Para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por bacterias como *Mannheimia haemolytica*, *P. multocida*, *Histophilus somni*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*; infecciones gastrointestinales causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella spp.* Infecciones genitourinarias y algunos casos de mastitis causadas por *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* y *E. coli*. Para el tratamiento de heridas y procesos piógenos, además de otras infecciones causadas por microorganismos sensibles a la enrofloxacin.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar 1 a 3 ml/40 kg de peso (equivalente a 2.5 - 7.5mg/kg), dosis única o repetir si es necesario a las 72 horas. No se administre más de 15 ml por sitio de aplicación.

La duración del tratamiento será a recomendación del Médico Veterinario.

Vía de Administración: Intramuscular o subcutánea.



ADVERTENCIAS

- Los animales tratados no deben de sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento.
 - La leche de los animales tratados no debe utilizarse para consumo humano hasta 7 ordeños (84 horas) después de finalizado el tratamiento.
 - Conservese a temperatura ambiente entre 15°C a 30°C.
 - No se almacene junto a alimentos y bebidas.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Maxflor® Duo

No. de Reg. Q-0042-418
USO VETERINARIO



MENU

REGRESAR



Antimicrobiano inyectable de amplio espectro, asociado a un antiinflamatorio no esteroide

PRESENTACIÓN:

Frasco con 250 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Florfenicol.....400 mg
Flunixin meglumina.....36.5 mg
(equivalente a 22 mg de flunixin base)
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

Maxflor® Duo contiene florfenicol y meglumina de flunixin. El florfenicol es un antimicrobiano de amplio espectro que inhibe la síntesis de proteína a nivel de ribosoma. Meglumina de flunixin, es un antiinflamatorio no esteroide (AINE), con efecto analgésico y antipirético que actúa por bloqueo de la enzima ciclo oxigenasa. Está indicado para el tratamiento de las infecciones y la incorporación al consumo de alimento en el corral de engorda.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar 1 ml por cada 20 kg de peso (20 mg/kg de peso de florfenicol y 1.1 mg/kg de peso de flunixin base), vía intramuscular. Se recomienda una segunda aplicación a las 48 horas. Administrar 1 ml por cada 10 kg de peso (40 mg/kg de peso de florfenicol y 2.2 mg/kg de peso de flunixin base) vía subcutánea, dosis única.

La duración del tratamiento será a criterio del Médico Veterinario.

Vía de administración: Vía subcutánea.



ADVERTENCIAS

- Periodo de retiro: Carne 38 días.
 - No se administre en animales menores de 6 semanas de edad.
 - No se administre en vacas en lactación.
 - No se administre en terneros destinados a consumo humano.
 - Consérvese a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - La solución puede presentar cambio de color sin que esto afecte a su eficacia.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



MENU

REGRESAR



Antibacteriano de amplio espectro en solución inyectable de larga acción gracias a su excipiente POC (Potencialized Organic Carrier) que permite estabilidad y alta concentración en poco volumen.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml y 250 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Florfenicol.....400 mg
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

Antibiótico de amplio espectro para uso en bovinos (productores de carne) y porcinos. Para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por bacterias como *Mannheimia haemolytica*, *P. multocida*, *Haemophilus somnus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, síndrome diarreico causado por *Escherichia coli*, *Salmonella spp*, pododermatitis infecciosa bovina asociada a *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides melanogenicus*, *Bacteroides nodosus* así como en queratoconjuntivitis infecciosa bovina causada por *Moraxella bovis* y otras enfermedades causadas por bacterias susceptibles al efecto del Florfenicol.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar una dosis de 1 ml/20 kg de peso, equivalente a 20 mg/kg, y repetir a las 48 horas.

Bovinos (productores de carne) vía subcutánea: Administrar una dosis 1 ml/10 kg de peso, equivalente a 40 mg/kg como dosis única.

Porcinos intramuscular:

Administrar 1 ml/26.7 kg de peso, equivalente a 15 mg/kg, y repetir a las 48 horas.

Vía de administración: Bovinos: intramuscular y subcutánea. Porcinos: intramuscular.



ADVERTENCIAS

- No se recomienda su uso en ganado lechero en producción.
- La solución puede presentar cambio de color a amarillo más intenso sin que esto afecte su eficacia.
- Consérvese a temperatura ambiente protegido de la luz solar directa, máximo 30°C.

Periodo de retiro:

• **Bovinos tratados vía intramuscular:** 28 días posteriores al último tratamiento.

Bovinos tratados vía subcutánea: 39 días.

• **Cerdos:** 10 días posteriores al último tratamiento

• Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

• Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

MENU

REGRESAR



Suspensión antibiótica inyectable.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml y 250 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Amoxicilina (Trihidrato).....100 mg
Colistina.....250,000 UI
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

Antimicrobiano para el tratamiento de diarreas bacterianas, neumonías, bronconeumonías, onfalitis, artritis, mastitis y todos aquellos procesos infecciosos causados por microorganismos sensibles a la fórmula, en bovinos, (productores de carne y leche), porcinos, caprinos y ovinos.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar 1 ml por cada 10 kg de peso (equivalente a 10 mg/kg de amoxicilina y 25,000 UI/kg de colistina), cada 24 horas durante 3 a 5 días. En casos graves se recomienda duplicar la dosis inicial.

Vía de Administración: Intramuscular.



ADVERTENCIAS

- Periodo de retiro:
Carne: 8 días
Leche: 4 ordeños
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Agite el producto antes de usar.
 - Consérvese a temperatura ambiente.
 - Use jeringas secas.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



MENU

REGRESAR



Antibiótico y antiinflamatorio en suspensión inyectable.

PRESENTACIÓN:
Frasco con 100 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:
Penicilina G procaína.....200,000 UI
Dihidroestreptomicina base.....164 mg
Dexametasona acetato.....0.4 mg
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

En bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equinos y caninos para el tratamiento de neumonías, procesos que cursan con inflamación como castraciones, heridas, tratamientos postoperatorios y otras infecciones causadas por bacterias sensibles a la fórmula.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar 1 ml por cada 10 a 20 kg de peso (10,000 a 20,000 UI/kg equivalente a 10-20 mg de penicilina G procaína; 8.2-16.4 mg/kg de dihidroestreptomicina base y 0.02-0.04 mg/kg de dexametasona acetato) cada 24 horas durante 3 a 5 días. Vía de Administración: Intramuscular.



ADVERTENCIAS

- No administrar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano, ni consumir la leche de los animales tratados hasta 8 ordeños posteriores a la última aplicación.
 - No administrar este producto a equinos destinados para consumo humano.
 - Para tiempo prolongado de almacenaje, consérvese a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa.
 - Agite el producto antes de usar.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Shotapen® Classic

No. de Reg. Q-042-413
USO VETERINARIO

MENU

REGRESAR



Suspensión antibiótica inyectable

PRESENTACIÓN:
Frasco con 250 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:
Penicilina G procaína.....200,000 UI
Dihidroestreptomicina (sulfato).....164 mg
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

Para el tratamiento de procesos infecciosos causados por microorganismos sensibles a la fórmula en bovinos (productores de carne y leche), caprinos, ovinos, porcinos y caninos.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Porcinos y bovinos: Administrar 1 ml por cada 20 kg de peso (10,000 UI/kg).

Caprinos y ovinos: Administrar 1 ml por cada 10 kg de peso (20,000 UI/kg).

Caninos: Administrar 0.5 ml por cada 5 kg de peso (20,000 UI/kg).

Cada 24 horas durante 5 días.

Vía de administración: Intramuscular



ADVERTENCIAS

- No administrar este producto 8 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano, ni consumir la leche de los animales tratados hasta 6 ordeños posteriores a la última aplicación.
 - Para tiempo prolongado de almacenaje, consérvese entre 2 y 8 °C.
 - Agite el producto antes de usar.
 - Protéjase de la luz solar directa.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



MENU

REGRESAR



Antibiótico en suspensión inyectable.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml y 250 ml.



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Penicilina G procaina¹10 g
Penicilina G benzatina²10 g
Dihidroestreptomicina sulfato³20. 5 g
Vehículo c.b.p.100 ml

¹ Equivalente a 5.68 g de bencilpenicilina, ² Equivalente a 7.36 g de bencilpenicilina, ³ Equivalente a 16.4 g de dihidroestreptomicina base.



INDICACIONES

Para el tratamiento de procesos infecciosos causados por neumonías bacterianas, síndrome MMA (mastitis, metritis, agalactia), infecciones puerperales, clostridiasis, erisipela, heridas infectadas, tratamiento postoperatorio y enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la penicilina y la estreptomicina, en bovinos (productores de carne y leche), porcinos, ovinos, equinos, caninos y felinos.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar 1 ml por cada 10 a 20 kg de peso (10,000 a 20,000 UI/kg o 10 a 20 mg/kg) y repetir a las 72 horas si es necesario, a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración: Intramuscular.



ADVERTENCIAS

- Periodo de retiro:
Carne: 10 días
Leche: 10 ordeños
 - No administrar este producto a equinos destinados para el consumo humano.
 - Para tiempo prolongado de almacenaje, consérvese entre 2 y 8°C, protegido de la luz solar directa.
 - Agite el producto antes de usar.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Tulissin® 100

No. de Reg. Q-0042-478
USO VETERINARIO



MENU

REGRESAR



Antimicrobiano para bovinos y porcinos

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml y 500 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Tulatromicina100 mg
Vehículo c.b.p.1 ml



INDICACIONES

En bovinos (carne y productores de leche en período seco) indicado como tratamiento y metafilaxia del complejo respiratorio bovino (CRB) asociado a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni* y *Mycoplasma bovis* sensibles a la tulatromicina. La presencia de la enfermedad en el hato debe establecerse antes del tratamiento metafiláctico.

Tratamiento de queratoconjuntivitis infecciosa bovina asociada a *Moraxella bovis* sensible a tulatromicina.

Tratamiento de pododermatitis (necrobacilosis interdigital) asociada a *Fusobacterium necrophorum* y *Porphyromonas levii*.

En porcinos (lechones destetados y en crecimiento) indicado como tratamiento y metafilaxia de complejo respiratorio porcino (CRP) asociado con *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Haemophilus parasuis* y *Bordetella bronchiseptica* sensible a la tulatromicina. La presencia de la enfermedad en el hato debe ser confirmada antes del tratamiento metafiláctico. Tulissin® 100 debe usarse solo si se espera que los porcinos desarrollen la enfermedad dentro de los 2 a 3 días siguientes.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos: administrar una sola dosis de 2.5 mg de Tulatromicina/kg de peso (equivalente a 1 ml/40 kg de peso).

Porcinos: administrar una sola dosis de 2.5 mg de Tulatromicina/kg de peso (equivalente a 1 ml/40 kg de peso) en la tabla del cuello.

Vía de administración:

Bovinos: subcutánea.

Porcinos: intramuscular.



ADVERTENCIAS

Periodo de retiro:

Bovinos, carne: 18 días.

Porcinos, carne: 5 días.

- No utilizar el producto en animales que estén produciendo leche para el consumo humano.
- Consérvese a temperatura ambiente.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Una vez abierto su vida útil es de 28 días.
- Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Veterralent® 20% L.A.

No. de Reg. Q-0042-056
USO VETERINARIO



ANTIBIÓTICOS

MENU

REGRESAR



Oxitetraciclina de larga acción en solución inyectable

PRESENTACIÓN:
Frasco con 250 ml.



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina (dihidrato).....20 g
Vehículo c.b.p.....100 ml



INDICACIONES

Para el tratamiento de enfermedades causadas por organismos sensibles a la oxitetraciclina en bovinos (productores de carne y leche), porcinos, ovinos y caprinos.

En casos de neumonías, infecciones gastroentéricas, gabarro y síndrome MMA en cerdos.

Útil en el tratamiento de fiebre de embarque (pasteurellosis), anaplasmosis y actinobacilosis.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar 1 ml por cada 10 kg de peso (20 mg/kg de peso), dosis única.

Repetir si es necesario a las 72 horas.

Vía de Administración: Intramuscular o subcutánea.



ADVERTENCIAS

- No administrar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano, ni consumir la leche de los animales tratados hasta 60 horas después de la última aplicación.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Consérvese a temperatura ambiente.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

ANTI INFLAMATORIOS





MENU

REGRESAR



Antiinflamatorio no esterooidal en solución inyectable

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml y 250 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Fenilbutazona.....200 mg
Salicilato de sodio.....20 mg
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

En bovinos (productores de carne y leche), equinos y porcinos, para el tratamiento de artritis infecciosas, traumáticas y reumáticas, infecciones pulmonares agudas, miocarditis y endocarditis, así como afecciones músculo esqueléticas, luxaciones, tendinitis y traumatismos.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos (productores de carne y leche) y caballos adultos: 4-8 mg/kg de peso. 1er día de 20 a 30 ml, para animales entre 500 y 750 kg de peso. 2do día 20 ml, para animales de 500 kg de peso. 3er día 10 ml, para animales de 500 kg de peso. **Becerras y potrillos:** 4-8 mg/kg de

peso. 1er día 10 ml, para animales de hasta 250 kg. Reducir la dosis a 6 ml a partir del 3er día al 5to día. **Cerdos:** 20 a 40 mg/kg de peso. Administrar 10 ml por cada 50 a 100 kg de peso cada 24 horas durante 3 a 5 días. **Cerdos de más de 100 kg de peso:** Administrar 15 ml cada 24 horas durante 3 a 5 días. **Vía de administración:** Vía intramuscular o intravenosa.



ADVERTENCIAS

- Periodo de retiro:
Carne, 15 días
Leche, 4 ordeños.
 - No administrar este producto a equinos destinados para consumo humano.
 - Consérvese a temperatura ambiente, protegido de la luz.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
 - Efectos secundarios:
• La fenilbutazona en tratamientos prolongados se caracteriza por una acción antivitaminas C, en consecuencia se recomienda realizar un aporte suplementario de esta vitamina.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



MENU

REGRESAR



Antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esterooidal en solución inyectable

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml y 250 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Flunixin Meglumina.....83 mg

(equivalente a 50 mg de Flunixin base)

Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

En bovinos (productores de carne y leche), cerdos y equinos, para el tratamiento de inflamaciones y dolores asociados con alteraciones músculo esqueléticas e inflamación aguda relacionada con enfermedades del tracto respiratorio y reproductivo.

En bovinos y cerdos: Útil en el tratamiento de neumonías, septicemias, mastitis y diarrea.

En equinos: Dolores viscerales asociados al cólico e inflamación muscular.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos (productores de carne y leche): Administrar 2 ml por cada 45 kg de peso (2.2 mg/kg), cada 12 a 24 horas, por un periodo de hasta 5 días consecutivos.

Cerdos: Administrar 2 ml por cada 45 kg de peso (2.2 mg/kg), cada 12 a 24 horas de acuerdo a la severidad del caso.

Equinos: 1 ml por cada 45 kg de peso (1.1 mg/kg), cada 12 a 24 horas.

El tratamiento puede ser repetido por un periodo de hasta 4 días si reaparecen los síntomas.

Vía de Administración:

Bovinos: intramuscular e intravenosa.

Cerdos: intramuscular profunda.

Equinos: intravenosa



ADVERTENCIAS

- No administrar a animales de menos de 3 días de edad.
- No administrar más de 10 ml en el mismo sitio de aplicación.
- El periodo de retiro para la carne de los animales destinados para consumo humano después de la última aplicación del producto es:

Bovinos: 1 día.

Cerdos: 21 días.

- No administrar a equinos destinados al consumo humano.
 - No consumir la leche de los animales tratados hasta 12 horas después de la última aplicación.
 - No administrar a caballos con historial de hipersensibilidad al flunixin.
 - Evitar la inyección intraarterial a equinos, ya que pueden presentar reacciones adversas tales como: incoordinación, hiperventilación, histeria y debilidad muscular. Estos signos son pasajeros y desaparecen sin la necesidad de tratamiento.
 - No exceder la dosis recomendada.
 - No mezclar con otras sustancias en la misma jeringa.
 - La causa de la inflamación, del dolor o del cólico debe ser determinada y tratada paralelamente con la terapia adecuada.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos
 - Consérvese a temperatura ambiente, máximo 30°C.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

ANTI PARASITARIOS



Acatak® POUR ON

No. de Reg. Q-0042-501
USO VETERINARIO



ANTIPARASITARIOS



MENU

REGRESAR



Inhibidor del desarrollo de las garrapatas de acción sistémica para el control de garrapatas en bovinos

PRESENTACIÓN:

1 L y 5 L.



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Fluazuron.....2.50 g
Vehículo c.b.p.....100 ml



INDICACIONES

Acatak® POUR ON es un inhibidor del desarrollo de las garrapatas (*Boophilus* spp, *Amblyomma* spp) de acción sistémica para uso en bovinos de engorda y cría. El producto penetra a través de la piel y se deposita en la grasa, donde se libera a la sangre por periodos de hasta 12 semanas. Acatak® POUR ON llega a las garrapatas a través de la sangre del animal tratado. Impide la maduración de las diferentes etapas y rompe el ciclo biológico de la garrapata en la mayoría de sus etapas, controlando y disminuyendo la población en potreros.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La dosis recomendada de Acatak POUR ON es 5 ml del producto por cada 50 kg de peso.

Vía de administración: percutánea. Administrar a lo largo del dorso del animal en dos franjas, una a cada lado de la línea dorsal, desde la cruz hasta la base de la cola. No aplicar en animales mojados. Después de 2 horas de aplicado el producto, la lluvia no afecta la eficacia de Acatak® POUR ON

Peso del animal (kg)	Dosis de Acatak® POUR ON	Peso del animal (kg)	Dosis de Acatak® POUR ON
30 a 50 kg	5 ml	351 a 400 kg	40 ml
51 a 100 kg	10 ml	401 a 450 kg	45 ml
101 a 150 kg	15 ml	451 a 500 kg	50 ml
151 a 200 kg	20 ml	501 a 550 kg	55 ml
201 a 250 kg	25 ml	551 a 600 kg	60 ml
251 a 300 kg	30 ml	Más de 600 kg	5 ml/50 kg
301 a 350 kg	35 ml		



ADVERTENCIAS

Acatak® POUR ON aplicado según las indicaciones de la etiqueta no presenta efectos colaterales. ACATAK® POUR ON es compatible con los garrapaticidas convencionales, mosquicidas, antihelmínticos, vitaminas y vacunas.

Período de retiro: No sacrificar animales para consumo humano antes de 6 semanas del último tratamiento.

No aplicar en vacas lecheras en lactación, cuya leche sea destinada al consumo humano. No sacrificar para consumo humano terneros de menos de 10 meses de edad que estén siendo amamantados por vacas tratadas. Se pueden tratar vacas preñadas, sin embargo para evitar complicaciones por estrés de manejo, no tratar vacas gestantes durante las 6 semanas previas al parto.

Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



MENU

REGRESAR

ANTIPARASITARIOS



Insecticida-Acaricida para el control de garrapatas en bovinos. Concentrado Emulsionable



PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml y 1 L.



FÓRMULA

Composición porcentual:

Cymiazol:

2-(2,4-dimetilfenilimino)-3-metil-4

tiazolina.....17.5%

Equivalente a 175 g de I.A./L

Cipermetrina: (±) Alfa-Ciano-3-fenoxibencil

(±)-cis,trans-3-(2,2diclorovinil)-2,2- dimetil-ciclopropan

ocarboxilato.....2.5%

Equivalente a 25 g de I.A./L

Vehículo, agentes tenso activos y

surfactante.....80.0%



INDICACIONES

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Ectogan™ es un garrapaticida para baños de inmersión y baño por aspersión. Controla garrapatas monohospedadoras (*Boophilus microplus* y *Boophilus annulatus*) en ganado bovino.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

PREPARACIÓN DE BAÑOS PARA INMERSIÓN:

Llenar con agua el baño hasta el nivel adecuado. Debe conocerse exactamente la cantidad de agua que contiene el baño.

CARGA INICIAL:

Agregar 1.5 L de ECTOGAN por cada 1,000 litros de agua (300 ppm).

PREPARACIÓN:

Realizar una premezcla en un recipiente (cubeta o tambo), agregando la cantidad de agua adecuada, revolver continuamente para obtener una mezcla fluida que se vierte en el baño. Agitar bien el baño para obtener una buena distribución del producto, aún en el fondo.

RECARGA:

Cuando se considere necesario, reponer el agua gastada. Se debe agregar 3 litros de ECTOGAN por cada 1,000 litros de agua que se adicionen al baño o cantidades proporcionales de garrapaticida y agua. Las indicaciones para la preparación de la premezcla son iguales a las señaladas para la carga inicial.

REPOSICIÓN POR ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA:

Si el nivel del agua del baño se afecta por entrada de agua de lluvia, agregar 3 litros de ECTOGAN por cada 1,000 litros de agua que entró.

PREPARACIÓN DE MEZCLAS PARA ASPERSIÓN:

Mezclar 20 mL de ECTOGAN por cada 10 litros de agua y aplicar con bomba o aspersor manual, procurando mojar bien la capa de pelo y piel.



ADVERTENCIAS

- No bañar o asperjar en días lluviosos.
- No mezclar ECTOGAN con ningún otro producto, especialmente con organofosforados, piretroides o amidinas en los días de uso.
- No tratar a los animales enfermos, débiles, cansados o sedientos.
- Tratar a los animales menores de 3 meses de edad con cuidado.
- Los animales no deberán bañarse o asperjarse en las horas más cálidas del día.
- No sacrificar el ganado para consumo humano antes de transcurridos 3 días de la última aplicación

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

EFFIPRO® BOVIS

No. de Reg. Q-0042-458
USO VETERINARIO



ANTIPARASITARIOS



MENU

REGRESAR



Antiparasitario externo para bovinos a base de fipronil,
en solución percutánea

PRESENTACIÓN:

1 L y 5 L.



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Fipronil.....1 g
Vehículo c.b.p.....100 ml



INDICACIONES

EFFIPRO® BOVIS es un antiparasitario externo para uso en bovinos (productores de carne), indicado en el tratamiento y control de infestaciones de la mosca del cuerno (*Haematobia irritans*), garrapatas (*Rhipicephalus microplus*), piojos masticadores (*Damalinea bovis*) y piojos chupadores (*Linognathus vituli*).



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar 1 ml por cada 10 kg de peso, equivalente a 1 mg de fipronil.

Vía de Administración: Percutánea. Administrar a lo largo del lomo del animal en la línea que va desde la cruz hasta la base de la cola.

Tabla de dosificación por peso

Peso corporal (kg)	Dosis (ml)
0-100	10
150	15
200	20
250	25
300	30
350	35
400	40
450	45
500	50



ADVERTENCIAS

- No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta 83 días después de la última administración.
 - No administrar en animales cuya leche se destine a consumo humano.
 - No tratar vacas gestantes en los últimos 3 meses de gestación.
 - Mantener el producto a temperatura ambiente.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Consérvese en su envase original, perfectamente cerrado.
 - No exponer a la luz solar.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

MENU

REGRESAR



ANTIPARASITARIOS



Antiparasitario de amplio espectro para equinos

PRESENTACIÓN:

Jeringa de 7.49 g.



FÓRMULA

Cada 1 g contiene:

Ivermectina18.7 mg
Praziquantel140.3 mg
Excipiente c.b.p.....1.0 g



INDICACIONES

EQUIMAX® pasta/gel parasiticida de amplio espectro para equinos, está indicado para el tratamiento de parasitosis internas de los equinos causadas por: **Grandes strongilos:** *Strongylus vulgaris* (adultos y estadio arterial), *Strongylus edentatus* (adultos y larva enquistada), *Strongylus equinus* (adulto), *Tridontophorus spp* (adulto). **Pequeños strongilos:** *Cylicocylus spp* (adulto y larvas del 4° estadio), *Cylicostephanus spp* (adulto y larvas del 4° estadio), *Cylicodontophorus spp* (adulto y larvas del 4° estadio), *Gyallocephalus spp* (adulto y formas inmaduras), *Cyathostomum spp* (adulto y larvas del 4° estadio). **Otros nematodos:** *Parascaris equorum* (adulto y larvas de 3° y 4° estadio), *Oxyuris equi* (adulto y larvas de 3° y 4° estadio), *Trichostrongylus axei* (adulto), *Strongyloides westeri* (adulto), *Habronema muscae* (adulto), *Onchocerca spp* (Microfilaria), *Dictyocaulus armfieldi* (adulto y larvas del 4° estadio). **Cestodos:** *Anoplocephala magna*, *Anoplocephala perfoliata*, *Paranoplocephala mamillana*. **Larvas:** *Gasterophilus spp* (estadio oral y

gástrico). EQUIMAX® pasta/gel parasiticida de amplio espectro para equinos, está indicado también para el control de larvas de *Habronema spp*, *Draschia spp* y microfilarias cutáneas de *Onchocerca spp*.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Se recomienda una única administración de 200µg de Ivermectina y 1.5 mg de Praziquantel por kg de peso corporal. 1.07g de pasta tratan 100kg de peso. Cada graduación de la jeringa permite tratar 50kg de peso.

Vía de Administración: oral, en la base de la lengua



ADVERTENCIAS

- Para uso en equinos. No debe ser usado en equinos destinados para el consumo humano.
 - No fumar ni comer durante la manipulación del producto.
 - Lavarse las manos después de la manipulación del producto o en caso de contacto accidental con el mismo.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños.
 - En caso de ingestión accidental consulte a su Médico.
 - Manténgase en su empaque original, en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



ANTIPARASITARIOS

MENU

REGRESAR



Antiparasitario externo para uso en en solución percutánea

PRESENTACIÓN:
1 L.



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Fluazuron	2.5 g
Clorpirifos	7.0 g
Cipermetrina	6.0 g
Butóxido de piperonilo	6.0 g
Vehículo c.b.p.	100.0 ml



INDICACIONES

FORTIK 4 es un antiparasitario externo para uso en bovinos (carne), indicado para el tratamiento y control de ectoparasitosis bovinas causadas por *Haematobia irritans* (mosca del cuerno), garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* y larvas de la mosca *Dermatobia hominis*.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar 1 ml por cada 10 kg de peso, equivalente a 2.5 mg/kg de fluazuron, 7 mg/kg de clorpirifos, 6 mg/kg de cipermetrina y 6 mg/kg de butóxido de piperonilo. Dosis única.

Vía de administración: Percutánea. Administrar a lo largo del lomo del animal en la línea que va desde la cruz hasta la base de la cola.

Tabla de dosificación por peso			
Peso corporal (kg)	Dosis (ml)	Peso corporal (kg)	Dosis (ml)
100	10	350	35
150	15	400	40
200	20	450	45
250	25	500	50
300	30		



ADVERTENCIAS

FORTIK 4 es seguro cuando es utilizado en la dosis recomendada. El animal puede presentar reacciones cutáneas en casos de sensibilidad a los componentes de la fórmula, o por el uso incorrecto del producto, como por ejemplo, la distribución no homogénea de la dosis recomendada a lo largo del dorso del animal, o sobredosis. Evite el contacto del producto con los ojos del animal. Consérvese en su envase original, perfectamente cerrado, entre 15°C a 30°C, al abrigo de la luz solar directa.

• **Periodo de retiro:** No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta 33 días después de la última administración. No administrar en animales cuya leche se destine a consumo humano.

• Contraindicaciones

No aplicar en los horarios más calientes del día, preferentemente administrar con temperatura no mayor a 30°C. No administrar en animales mojados o en días de lluvia. No utilizar en hembras lactantes. No utilizar en animales enfermos o convalecientes. No aplicar en heridas abiertas.

• Precauciones durante el manejo del producto

• No use el producto sin el equipo de protección adecuado.
• No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
• No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.

• Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.

• No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel. En caso de intoxicación, lleve al paciente con el médico y muéstrela esta etiqueta.

• **Antídoto específico:** Sulfato de atropina, 1 a 6 mg cada 30 minutos, hasta leve atropinización (nunca administre sulfato de atropina antes de que aparezcan los síntomas de intoxicación). Reactivador de colinesterasa: CONTRATHION, 1 a 2 mg en los tres primeros días.

Tratamiento sintomático: contraindicación: morfina, aminofilina.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA



MENU

REGRESAR

ANTIPARASITARIOS



Antiprotozoario para el tratamiento, control y prevención de anaplasmosis y babesiosis en bovinos, equinos y caninos

PRESENTACIÓN:
Frasco con 100 ml.



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:
Dipropionato de Imidocarb.....12 g
Vehículo c.b.p.....100 ml



INDICACIONES

Imidogan está indicado para el tratamiento, control y prevención de anaplasmosis y babesiosis en bovinos (productores de carne), equinos y caninos, incluyendo: *Babesia bovis*, *B. bigemina*, *B. equi*, *B. canis* y *Anaplasma marginale*. La babesiosis también conocida como piroplasmosis, tristeza, fiebre de Texas o agua roja, es una enfermedad que afecta a los glóbulos rojos y es transmitida por diferentes géneros de garrapatas. La enfermedad es causada por hemoprotozoarios del género *Babesia*. La anaplasmosis causada por *Anaplasma marginale* es otra enfermedad parasitaria que afecta los glóbulos rojos de los bovinos, puede ser transmitida por garrapatas, moscas, y otros insectos hematófagos. Ambas enfermedades también pueden ser transmitidas de forma iatrogénica.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tratamiento

Bovinos (productores de carne): Administrar 1 ml por cada 100 kg de peso (1.2 mg/kg de peso), para Babesiosis. Administrar 2.5 ml por cada 100 kg de peso (2.4 mg/kg de peso), para Anaplasmosis.

Equinos: Administrar 2 ml por cada 100 kg de peso (2.4 mg/kg de peso), para Babesiosis.

Caninos: Administrar 0.25 ml por cada 4.5 kg de peso, dosis única (6.67 mg/kg de peso) para Babesiosis.

Profilaxis

Bovinos (productores de carne): Administrar 2.5 ml por cada 100 kg de peso (3 mg/kg de peso), para Anaplasmosis y Babesiosis. Repetir a los 33-35 días una segunda aplicación, a recomendación del Médico Veterinario.

Equinos: Administrar 2 ml por cada 100 kg de peso (2.4 mg/kg de peso), para Babesiosis. Repetir si es necesario con un intervalo de 24-48 horas, a recomendación del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

Bovinos y caninos: administrar por vía subcutánea o intramuscular.

Equinos: administrar por vía intramuscular solamente.




ADVERTENCIAS

- No administrar este producto 28 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.
 - No se administre en bovinos que estén produciendo leche para consumo humano.
 - Consérvese a temperatura ambiente, máximo 30°C.
 - Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.
 - No administrar este producto a equinos destinados para consumo humano.
 - No se administre por vía intravenosa.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



MENU

REGRESAR



Suspensión antihelmíntica oral

PRESENTACIÓN:
1 L.



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:
Oxfendazol.....9.06 g
Vehículo c.b.p.....100 ml



INDICACIONES

Suspensión antihelmíntica de amplio espectro, con efecto ovicida para el tratamiento y control de los parásitos sensibles a la fórmula, tales como nematodos (gusanos redondos) gastrointestinales y pulmonares, cestodos (gusanos planos) y otros parásitos del ganado bovino y ovino.

Parásitos pulmonares:

Dictyocaulus viviparus

Parásitos gastrointestinales: (formas adultas, y cuarto estadio larvario) incluyendo:

Haemonchus contortus

Haemonchus placei

Trichostrongylus axei

Ostertagia ostertagi (incluyendo formas inhibidas)

Oesophagostomum radiatum

Bunostomum phlebotomum

Cooperia punctata

Cooperia macmasteri

Moniezia spp



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos (doble propósito): Administrar 5 ml de Oxfenil® por cada 100 kg de peso (equivalente a 4.5 mg de Oxfendazol / kg de peso).

Ovinos: Administrar 1 ml de Oxfenil® por cada 20 kg de peso (equivalente a 4.5 mg de Oxfendazol / kg de peso).

Vía de Administración: oral.

No administrar en primer tercio de gestación.

PESO (kg)	DOSIS (ml)	PESO (kg)	DOSIS (ml)
20	1	300	15
40	2	400	20
100	5	500	25
200	10	600	30



ADVERTENCIAS

- Periodo de retiro: Carne 10 días; Leche: 0 días.
 - Manténgase en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, máximo 30°C.
 - Consérvese en su envase original, perfectamente cerrado.
 - Una vez abierto el producto es estable durante 60 días almacenado a las condiciones recomendadas. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Supermetrina® pour-on

Reg. RSCO-PEC-MEZC-1165-303-098-020
USO VETERINARIO



MENU

REGRESAR

ANTIPARASITARIOS



Mosquicida, piojicida y sarnicida en solución oleosa, para el control de la mosca del cuerno y auxiliar en el control de la garrapata

PRESENTACIÓN:

Frasco con 250 ml y 1 L.



FÓRMULA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingredientes activos: Cipermetrina: (±)- Alfa - Ciano - 3 - fenoxibencil (±) - cis, trans - 3 - (2,2 diclorovinil) - 2,2 - dimetilciclopropanocarboxilato5%
(Equivalente a 50 g/l)
Etión: O,O,O 'O' - tetraetil 5,5 metilene bis fosforoditioato15%
(Equivalente a 150 g/l) 15
Ingredientes inertes: Solvente y vehículo.....80%
Total: 100%



INDICACIONES

La Cipermetrina se caracteriza por tener una acción insecticida y acaricida rápida al contacto con los parásitos externos, de los cuales son bloqueados la transmisión de los impulsos nerviosos hasta causar su muerte. El Etión es inhibidor de la actividad de las enzimas esterasas, en particular la colinesterasa, afectando los procesos fisiológicos de los parásitos. Está indicado para el control de ectoparásitos como mosca del cuerno (*Haematobia irritans*) mosca del establo (*Stomoxys calcitrans*), piojos chupadores y masticadores, (*Damalinia bovis*, *Haematopinus eurysternus*, *Linognathus vituli*, ácaros causantes de la sarna (*Sarcoptes scabiei*, *Chorioptes bovis*, *Demodex spp.*) y melófagos en bovinos.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Animales de 100 a 200 kg de peso corporal: 5 ml

Animales de 200 kg ó más: 10 ml

No se aplique en animales menores a 100 kg de peso.

Vía de Administración: Aplique sobre el dorso del animal, desde la cruz y hasta la cola, utilizando el vaso dosificador del envase.



ADVERTENCIAS

• La leche y la carne de los animales tratados con éste producto no deberán de ser consumidos sino hasta después de un tiempo de retiro de:

Carne: 10 días

Leche: 2 días

• Mantener el producto en su envase original, no utilice el envase vacío para otro propósito.

• Evite beber, comer, o fumar mientras se maneja el producto.

• Evite su ingestión, así como el contacto con mucosas ojos, en cuyo caso, se recomienda lavar con agua en abundancia.

• Use equipo de protección (guantes y ropa protectora) al momento de la aplicación.

• No se aplique en animales mojados o cuando exista amenaza de lluvia.

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.



ANTIPARASITARIOS



MENU

REGRESAR



Endectocida inyectable con efecto fasciolicida,
para su uso en bovinos, ovinos y caprinos.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 500 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Ivermectina.....10 mg
Clorsulón.....100 mg
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

Virbamec® F está indicado para el tratamiento de diversos parásitos internos y el control y tratamiento de parásitos externos en bovinos (productores de carne y leche), ovinos y caprinos incluyendo: a **Nemátodos gastrointestinales y Parásitos gastrointestinales:** (formas adultas y cuarto estadio larvario) incluyendo: *Ostertagia ostertagi* (incluso formas inhibidas), *O. lyrata*, *Teladorsagia circumcincta*, *Haemonchus contortus*, *H. placei*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*, *Cooperia pectinata*, *C. oncophora*, *C. punctata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Chabertia ovina*, *Nematodirus helvetianus* (adultos), *Nematodirus spp.*, *Strongyloides papillosus* (adultos), *Toxocara vitulorum* (adultos), *Oesophagostomum spp.*, *Trichuris bovis* (adultos). **Parásitos pulmonares:** *Dictyocaulus viviparus* (incluso formas inhibidas), *D. filaria*, *Protostrongylus rufescens*. **Parásitos del ojo:** *Thelazia spp.* (adultos). **Tremátodos:** *Fasciola hepatica* (adultos y estadios inmaduros de 8 semanas), *Fasciola gigantica* (adultos). **Control y tratamiento de ectoparásitos:** **Moscas:** Estadio larvario de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*, *Oestrus ovis*, y moscas chupadoras *Haematobia irritans*. **Piojos:** *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Damalinea bovis*, *Melophagus ovinus*. **Ácaros de la sarna:** *Psoroptes communis var. bovis* y *ovis*, *Sarcoptes scabiei var. bovis*, *Chorioptes bovis*.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos (productores de carne y leche), ovinos y caprinos: Administrar 1 ml por cada 50 kg de peso, a razón de 200 µg de ivermectina y 2 mg de clorsulón por kg de peso, dosis única.

Vía de Administración: Subcutánea o intramuscular.



ADVERTENCIAS

- No debe de administrarse por vía endovenosa.
 - No destinar para consumo humano a leche ni la carne de animales tratados hasta 28 días después de la última aplicación.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Consérvese a temperatura ambiente.
 - Prohibido el uso de este producto en el control de la garrapata *Boophilus spp.*
 - Lea el inserto anexo antes de usar el producto.
 - Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la ivermectina por lo cual los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados en forma segura enterrándolos o incinerándolos.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



MENU

REGRESAR



ANTIPARASITARIOS



Endectocida de larga acción para el tratamiento de parásitos internos y el control y tratamiento de parásitos externos en bovinos, porcinos, ovinos y caprinos

PRESENTACIÓN:

Frasco con 50 ml, 500 ml.



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Ivermectina.....1 g
Vehículo c.b.p.....100 ml



INDICACIONES

Virbamec® L.A. está indicado para el tratamiento de diversos parásitos internos y el control y tratamiento de parásitos externos incluyendo: **Parásitos gastrointestinales:** (formas adultas y cuarto estadio larvario) incluyendo: *Ostertagia ostertagi* (incluso formas inhibidas), *O. lyrata*, *Haemonchus contortus*, *H. placei*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*, *Cooperia pectinata*, *C. oncophora*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus* spp (adultos), *Strongyloides papillosus* (adultos), *Toxocara vitulorum* (adultos), *Ascaris suum*, *Hyostrogylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp y para formas adultas de *Strongyloides ransomi* y *Trichuris suis*. **Parásitos renales:** *Stephanurus dentatus*. **Parásitos pulmonares:** *Dictyocaulus viviparus*, (incluso formas inhibidas) y *Metastrongylus* spp. **Control y tratamiento de Ectoparásitos:** Moscas: Estadio larvario de *Dermatobia hominis* y moscas chupadoras. Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *H. suis*, *Solenopotes capillatus* y *Damalinea bovis*. Ácaros de la sarna: *Psoroptes communis* var. *bovis* y *ovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis* y *suis*, *Chorioptes bovis*, así como otros ácaros.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos (productores de carne y leche), ovinos y caprinos: 1 ml por cada 50 kg de peso (0.2 mg/kg).
Porcinos: 1 ml por cada 33 kg de peso (0.3 mg/kg).
Dosis única
Vía de Administración: Subcutánea o intramuscular.



ADVERTENCIAS

- No debe de administrarse por vía endovenosa.
- No destinar para uso humano la leche ni carne de animales tratados hasta 42 días después de la última aplicación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa, máximo 30°C.
- Prohibido el uso de este producto en el control de garrapatas *Boophilus* spp.
- Lea el inserto anexo antes de usar el producto.
- Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la ivermectina por lo cual los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados en forma segura enterrándolos o incinerándolos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



ANTIPARASITARIOS



MENU

REGRESAR



Endectocida de larga acción para el tratamiento de parásitos internos y externos en el ganado bovino. Incluyendo garrapatas del género *Boophilus Spp*

PRESENTACIÓN:
Frasco con 500 ml.



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Ivermectina.....3.15 mg
Vehículo c.b.p.....100 ml



INDICACIONES

Para el tratamiento y control de infestaciones parasitarias en bovinos causadas por: **Parásitos gastrointestinales:** (formas adultas y cuarto estadio larvario) *Ostertagia ostertagi* (incluso formas inhibidas), *O. lyrata*, *Haemonchus contortus*, *H. placei*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia pectinata*, *C. oncophora*, *Cooperia punctata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus spp* (adultos), *Toxocara vitulorum* (adultos).

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*.

Moscas: Estadio larvario de *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*, *Cochliomyia hominivorax* y moscas chupadoras.

Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus euryesternus*, *Solenopotes capillatus*, *Damalinea bovis*.

Ácaros de la sarna: *Psoroptes communis var. bovis*, *Sarcoptes scabiei var. bovis*, *Chorioptes bovis*.

Garrapatas: *Boophilus spp*.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos (productores de carne): Administrar 1 ml por cada 50 kg de peso a razón de 630 mcg de ivermectina por kg de peso, dosis única.

Vía de administración: subcutánea exclusivamente.



ADVERTENCIAS

- Agite el producto antes de usar.
- Manténgase fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- Manténgase alejado de alimentos y bebidas.
- No debe ser administrado por vía endovenosa.
- Lavarse las manos después de manipular el producto.
- No se use en vacas en producción de leche para consumo humano.
- No destinar para consumo humano la carne de animales tratados, hasta 122 días después de la última aplicación.
- Consérvese a temperatura ambiente, máximo 30°C.
- Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la ivermectina por lo cual los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados en forma segura enterrándolos o incinerándolos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

|BIOLÓGICOS



BOVIGEN® LEPTO 8

No. de Reg. B-0042-039
USO VETERINARIO



MENU

REGRESAR

BIOLÓGICOS



Vacuna inactivada para la prevención de la leptospirosis en bovinos, ovinos y porcinos

PRESENTACIÓN:

Frasco con 45 ml (15 dosis).



FÓRMULA

Cada dosis de 3 ml contiene:

Suspensión inactivada de
Leptospira interrogans serovariedad canicola..... $\geq 10^7$ bacterias
Leptospira interrogans serovariedad grippotyphosa $\geq 10^7$ bacterias
Leptospira interrogans serovariedad hardjo tipo hardjo-prajitno..... $\geq 10^7$ bacterias
Leptospira borgpetersenii serovariedad hardjo tipo hardjo-bovis..... $\geq 10^7$ bacterias
Leptospira interrogans serovariedad icterohaemorrhagiae..... $\geq 10^7$ bacterias
Leptospira interrogans serovariedad pomona..... $\geq 10^7$ bacterias
Leptospira interrogans serovariedad tarassovi..... $\geq 10^7$ bacterias
Leptospira interrogans serovariedad wolffi..... $\geq 10^7$ bacterias
vehículo c.b.p. 1 dosis.



INDICACIONES

Indicado para la prevención de leptospirosis en bovinos, ovinos y porcinos.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos: 3 ml

Ovinos y porcinos: 2 ml

Aplicar a partir de los 3 meses de edad dos dosis separadas por un intervalo de 21 a 30 días.

Refuerzo anual.

Vía de Administración

Subcutánea.

Agitar enérgicamente antes de su uso.

Usar material estéril para su administración y aplicar estrictas medidas de asepsia.



ADVERTENCIAS

- No administrar en animales enfermos, estresados o parasitados.
 - La administración de inyectables en animales sensibles, puede provocar desde reacciones locales hasta anafilácticas. Si es el caso, tratar con epinefrina antihistamínicos y corticosteroides.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Almacénese en refrigeración entre 2°C y 8°C, protegida de la luz.
 - No someter a calentamiento ni enfriamiento excesivo.
 - No permita el congelamiento.
 - Elimine los envases vacíos mediante incineración.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA



MENU

REGRESAR



Vacuna inactivada para la prevención de rinotraqueitis infecciosa bovina, diarrea viral bovina, leptospirosis y campilobacteriosis

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml (20 dosis)
y 250 ml (50 dosis).



FÓRMULA

Cada dosis de 5 ml contiene:

Suspensión inactivada de

Virus Herpes Bovino tipo 1 (BHV-1) $\geq 10^7$ DICT₅₀

Virus Herpes Bovino tipo 5 (BHV-5) $\geq 10^7$ DICT₅₀

Virus Diarrea Viral Bovina tipo 1 (BVDV-1) $\geq 10^6$ DICT₅₀

Virus Diarrea Viral Bovina tipo 2 (BVDV-2) $\geq 10^6$ DICT₅₀

Leptospira interrogans serovariedad canicola..... $\geq 10^7$ bacterias

Leptospira interrogans serovariedad grippotyphosa ... $\geq 10^7$ bacterias

Leptospira interrogans serovariedad hardjo tipo

hardjo-prajitno $\geq 10^7$ bacterias

Leptospira borgpetersenii serovariedad hardjo tipo

hardjo-bovis $\geq 10^7$ bacterias

Leptospira interrogans serovariedad

icterohaemorrhagiae..... $\geq 10^7$ bacterias

Leptospira interrogans serovariedad

pomona..... $\geq 10^7$ bacterias

Leptospira interrogans serovariedad

tarassovi..... $\geq 10^7$ bacterias

Leptospira interrogans serovariedad

wolffi..... $\geq 10^7$ bacterias

Campylobacter fetus subespecie

fetus.....40 mg

Campylobacter fetus subespecie

venerealis.....40 mg

Campylobacter fetus subespecie venerealis biotipo

intermedius.....40 mg

Selenato de sodio, vehículo c.b.p. 1 dosis.



INDICACIONES

Vacuna para la prevención de Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, Diarrea Viral Bovina, Leptospirosis y Campilobacteriosis de los bovinos. Contiene Selenio como adyuvante de la inmunidad.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos: administrar 5 ml.

Aplicar a partir de los 3 meses de edad dos dosis separadas por un intervalo de 21 a 30 días.

Refuerzo anual.

Vía de Administración

Subcutánea.

Agitar enérgicamente antes de su uso.

Usar material estéril para su administración y aplicar estrictas medidas de asepsia.



ADVERTENCIAS

- No administrar en animales enfermos, estresados o parasitados.
 - La administración de inyectables en animales sensibles, puede provocar desde reacciones locales hasta anafilácticas. Si es el caso, tratar con epinefrina antihistamínicos y corticosteroides.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Almacénese en refrigeración entre 2°C y 8°C, protegida de la luz.
 - No someter a calentamiento ni enfriamiento excesivo.
 - No permita el congelamiento.
 - Elimine los envases vacíos mediante incineración.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA
VETERINARIA



MENU

REGRESAR

BIOLOGICOS



Vacuna en suspensión inyectable, para la prevención de las enfermedades clostridiales incluyendo tétanos en bovinos, ovinos y caprinos

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml (20 dosis)
y 250 ml (50 dosis).



FÓRMULA

Cada dosis de 5 ml contienen:

<i>Clostridium chauvoei</i>	≥ 8 µl
<i>Clostridium novyi</i> tipo B.....	≥ 500 DLM
<i>Clostridium perfringens</i> tipo D.....	≥ 200 L+
<i>Clostridium perfringens</i> tipo B.....	≥ 200 L+
<i>Clostridium perfringens</i> tipo C.....	≥ 200 L+
<i>Clostridium perfringens</i> tipo A.....	≥ 20 L+
<i>Clostridium septicum</i>	≥ 100 DLM
<i>Clostridium haemolyticum</i>	≥ 0.4 UH
<i>Clostridium sordellii</i>	≥ 500 DLM
<i>Clostridium tetani</i>	≥ 3000000 DLM
Vehículo c.b.p.....	5 ml



INDICACIONES

Carbunco sintomático (*C. chauvoei*), Gangrena gaseosa o edema maligno (*C. perfringens* tipo A, *C. septicum*, *C. sordellii*, *C. novyi* tipo B, *C. chauvoei*)

Enterotoxemias: enteritis hemorrágica, enterotoxemia del ternero y disentería del cordero, enterotoxemia hemorrágica, riñón pulposo (*C. perfringens* tipo A, B, C y D), Hemoglobinuria bacilar (*C. haemolyticum*), Hepatitis necrótica infecciosa (*C. novyi* tipo B), Muerte súbita por clostridiosis (*C. perfringens* tipo D, *C. novyi* tipo B, *C. sordellii*, *C. chauvoei*, *C. haemolyticum*), Tétanos (*C. tetani*).



INDICACIONES

Bovinos: 5 ml

Ovinos y caprinos: 2 ml

Primovacuna: aplicar 1 dosis y repetir a los 21-30 días. Revacunar anualmente.

En crías de hembras no vacunadas comenzar la vacunación a los 15 días de vida.

En crías de hembras vacunadas comenzar la vacunación a los 2 meses de vida. En hembras gestantes la segunda dosis de la primovacuna o la única dosis de la revacunación anual debe administrarse 15 a 21 días antes del parto para una efectiva transferencia de anticuerpos colostrales.

En sistemas intensivos de producción o en zona con alta incidencia de clostridiosis se recomienda ajustar el esquema de vacunación según criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración: subcutánea o intramuscular.

Resuspender bien antes de aplicarse. Usar material estéril para su administración y aplicar estrictas medidas de asepsia.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN



ADVERTENCIAS

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
 - La administración de inyectables en animales sensibles puede provocar desde reacciones locales hasta anafilácticas. Si es el caso, tratar con epinefrina antihistamínicos y corticosteroides.
 - Vacunar solamente animales sanos.
 - CLOSTRIGEN® 9+T puede ser administrada simultáneamente con otros medicamentos veterinarios siempre que el material para la aplicación y el punto de inoculación sean diferentes.
 - Nunca mezclarlo con otros productos.
- PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica



MENU

REGRESAR



Vacuna en suspensión inyectable para la prevención de las enfermedades clostridiales y pasteurelosis en bovinos, ovinos y caprinos

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml (20 dosis)
y 250 ml (50 dosis).



FÓRMULA

Cada dosis de 5 ml contienen:

<i>Clostridium perfringens</i> tipo D.....	≥ 100 L+
<i>Clostridium novyi</i> tipo B.....	≥ 5 L+
<i>Clostridium septicum</i>	≥ 10 L+
<i>Clostridium chauvoei</i>	≥ 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium haemolyticum</i>	≥ 10 ⁹ UFC
<i>Clostridium sordellii</i>	≥ 10 ⁹ UFC
<i>Pasteurella multocida</i> tipo A.....	≥ 10 ⁹ UFC
<i>Mannheimia haemolytica</i>	≥ 10 ⁹ UFC
Vehículo c.b.p.....	5 ml



INDICACIONES

Para prevenir las infecciones por *C. chauvoei*, *C. septicum*, *C. novyi* tipo B, *C. haemolyticum*, *C. perfringens* tipo D, *C. sordellii*, *Mannheimia haemolytica* y *P. multocida* tipo A



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos: 5 ml

Ovinos y caprinos: 2 ml

Primovacuna: aplicar 1 dosis y repetir a los 21-30 días. Revacunar anualmente.

En crías de hembras no vacunadas comenzar la vacunación a los 15 días de vida.

En crías de hembras vacunadas comenzar la vacunación a los 2 meses de vida.

En hembras gestantes la segunda dosis de la primovacuna o la única dosis de la revacunación anual deben administrarse 15 a 21 días antes del parto para una efectiva transferencia de anticuerpos colostrales.

Vía de Administración: subcutánea o intramuscular. Resuspender bien antes de aplicarse. Usar material estéril para su aplicación y aplicar estrictas medidas de asepsia.



ADVERTENCIAS

- Usar bajo la supervisión de un Médico Veterinario.
 - No administrar en animales enfermos, estresados o parasitados.
 - La administración de inyectables en animales sensibles, puede provocar desde reacciones locales hasta anafilácticas. Si es el caso, tratar con epinefrina, antihistamínicos y corticosteroides.
 - Cualquier variación en el color del producto no afecta la estabilidad ni la eficacia del mismo.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños.
 - Conservación: entre 2 °C y 8 °C. No congelar.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
Su venta requiere receta médica veterinaria
PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA



BIOLÓGICOS

MENU

REGRESAR



Vacuna antirrábica inactivada líquida, cepa Pasteur en suspensión estéril, para la inmunización contra la rabia paralítica o derriengue en bovinos y equinos sanos

PRESENTACIÓN:

Caja con 5 frascos de 20 ml (10 dosis) y frasco 100 ml (50 dosis).



FÓRMULA

Cada dosis de 2 ml contiene:
Virus Rábico inactivado
Cepa Pasteur VP12 al menos.....2 UI
Vehículo c.b.p.....2 ml



INDICACIONES

Para la inmunización contra la Rabia Paralítica o Derriengue en bovinos y equinos sanos, en suspensión lista para aplicarse.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar una dosis de 2 ml por animal.

Vía de Administración: Intramuscular profunda exclusivamente.



ADVERTENCIAS

- Vacune únicamente animales sanos.
- Se recomienda la revacunación anual.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Manténgase en refrigeración entre 2 y 8°C y protegido de la luz.
- No permita el congelamiento.
- La rabia es una enfermedad mortal por lo que se recomienda manejar el producto de acuerdo a las normas epidemiológicas vigentes.
- Elimine los envases vacíos mediante incineración.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

INTRAMAMARIOS





MENU

REGRESAR



INTRAMAMARIOS



Suspensión intramamaria para el tratamiento de mastitis ambiental

PRESENTACIÓN:

Bolsa con 24 jeringas de 10 ml cada una.



FÓRMULA

Cada jeringa de 10 ml contiene:

Cefalexina monohidrato.....	105 mg
(Equivalente a 100 mg de cefalexina base)	
Neomicina sulfato.....	148 mg
(Equivalente a 100 mg de neomicina base)	
Prednisona base.....	10 mg
Excipiente c.b.p.....	10 ml



INDICACIONES

Para el tratamiento de mastitis de vacas en producción láctea causadas por gérmenes sensibles a la fórmula (neomicina + cefalexina).



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar el contenido de una jeringa por cada cuarto afectado cada 12 horas durante 2 ó 3 días.
Vía de administración: Intramamaria. Desinfectar la punta del pezón antes de la aplicación. Use la cánula corta exclusivamente en la punta del pezón. Aplique un ligero masaje sobre la ubre.



ADVERTENCIAS

- No utilizar para consumo humano la leche procedente de animales tratados hasta 10 ordeños posteriores a la última administración (5 días).
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Consérvese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol, máximo 30 °C.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



MENU

REGRESAR



Suspensión intramamaria para el secado de las vacas lecheras

INTRAMAMARIOS

PRESENTACIÓN:

Bolsa con 24 jeringas de 8 g cada una.



FÓRMULA

Cada jeringa de 8 g contiene:

Cefalexina (Benzatina).....375*mg

Excipiente c.b.p.....8 g

* Corresponde a 504.7 mg de cefalexina benzatínica.



INDICACIONES

Para su uso en bovinos (productores de leche), para el secado de las vacas lecheras y mastitis durante el periodo seco.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar el contenido de una jeringa por cada cuarto afectado al final del último ordeño del periodo de lactación, única dosis.

Vía de Administración: Intramamaria. Desinfecte la punta del pezón antes de la aplicación. Use la cánula corta exclusivamente en la punta del pezón. Aplique un ligero masaje sobre la ubre.



ADVERTENCIAS

- No aplicar a vacas lactantes.
 - Consérvese a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa, máximo 30 °C.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

MENU

REGRESAR



INTRAMAMARIOS



Suspensión intramamaria para el periodo seco

PRESENTACIÓN:

Bolsa con 24 jeringas de 10 ml cada una.



FÓRMULA

Cada jeringa de 10 ml contiene:

Cefalexina (benzatina).....250 mg
Neomicina (sulfato).....250 mg
Excipiente c.b.p.....10 ml



INDICACIONES

Para el tratamiento de la mastitis durante el periodo seco en ganado lechero.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos (productores de leche): Administrar el contenido de una jeringa por cada cuarto al final del último ordeño del periodo de lactación.

Vía de administración: Intramamaria. Desinfectar la punta del pezón antes de la aplicación. Use la cánula corta exclusivamente en la punta del pezón. Aplique un ligero masaje sobre la ubre.



ADVERTENCIAS

- No aplicar a vacas lactantes.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Consérvese a temperatura ambiente protegido de la luz solar directa. máximo 30 °C
- Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

CLOXA 1000

No. de Reg. Q-0042-096
USO VETERINARIO

MENU

REGRESAR



Suspensión intramamaria para el periodo seco

INTRAMAMARIOS

PRESENTACIÓN:

Bolsa con 24 jeringas de 8 g cada una.



FÓRMULA

Cada jeringa de 8 g contiene:

Cloxacilina (Benzatina)..... 1 g
Excipiente c.b.p..... 8 g



INDICACIONES

Para la prevención de mastitis durante el periodo seco en bovinos (productores de leche).



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar el contenido de una jeringa por cada cuarto afectado al final del último ordeño del periodo de lactación, única dosis.

Vía de Administración: Intramamaria. Desinfectar la punta del pezón antes de la aplicación. Use la cánula corta exclusivamente en la punta del pezón. Aplique un ligero masaje sobre la ubre.



ADVERTENCIAS

- No aplique a vacas lactantes.
 - Consérvese a temperatura ambiente.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

NUTRICICC1CN(C)CC1LES



MENU

REGRESAR



Reconstituyente mineral en solución acuosa inyectable

PRESENTACIÓN:

Frascos con 100 ml y 500 ml.



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Glicerofosfato de sodio 5.5 H ₂ O.....	14.00 g
Fosfato monosódico 2 H ₂ O.....	20.10 g
Cloruro de cobre 2 H ₂ O.....	0.40 g
Cloruro de potasio.....	0.60 g
Cloruro de magnesio 6 H ₂ O.....	2.50 g
Selenato de sodio.....	0.24 g
Vehículo c.b.p.....	100 ml



INDICACIONES

FOSFOSAN® está indicado en bovinos (doble propósito) y porcinos (carne y pie de cría) para la prevención y tratamiento de deficiencias de fósforo, selenio, magnesio, cobre y potasio, y sus consecuencias tales como osteomalacia, raquitismo, síndrome de infertilidad carencial, distrofia muscular, retención de placenta, desórdenes nerviosos, tetania hipomagnésica.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos: adultos 10 ml, terneros 5 ml

Porcinos: 5 ml

Administrar como dosis única. Puede repetirse el tratamiento a los 15 días dependiendo del estado nutricional del animal.

La duración del tratamiento será a recomendación del Médico Veterinario.

Vía de Administración: Subcutánea o intramuscular.



ADVERTENCIAS

- Aplicar estrictas medidas de asepsia.
- Puede provocar un ligero edema o inflamación en la zona de aplicación, que desaparece rápidamente.
- Consérvese en su envase original, perfectamente cerrado.
- Consérvese a no más de 30°C, protegido de la luz directa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

MENU

REGRESAR



Estimulante del apetito, desintoxicante digestivo y protector hepático, en solución inyectable

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Ácido genabólico50 mg
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

Problemas hepatodigestivos como gastroenteritis y hepatitis, intoxicaciones alimenticias crónicas y agudas, coadyuvante en el tratamiento de acetonemia, fiebre de leche, tetania de los pastos, enterotoxemia, acidosis metabólica y timpanismo. Estimula el proceso digestivo, la diuresis y favorece el tránsito intestinal.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos (carne y leche): Administrar 1 ml por cada 10 a 20 kg de peso. (equivalente a 2.5 a 5 mg/kg).

Ovinos, caprinos y porcinos: Administrar 1 ml por cada 10 kg de peso. (equivalente a 5 mg/kg).

Repetir la dosis a las 48 horas de ser necesario.

Vía de Administración: intramuscular o intravenosa lenta.



ADVERTENCIAS

- No destinar para el consumo humano la carne de animales tratados hasta 24 horas posteriores a la última aplicación.
- No hay residuos en la leche.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Consérvese a temperatura ambiente, no mayor a 30 °C.
- Una vez abierto el producto se debe usar en 30 días; descarte el sobrante después de ese periodo.
- Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

MENU

REGRESAR



Fósforo inyectable en solución acuosa

PRESENTACIÓN:
Frasco con 250 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:
Dimetil amino-ortotolueno metil fenil fosfonato de sodio trihidrato.....200 mg
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

En bovinos, ovinos y caprinos para el tratamiento de desbalances metabólicos de fósforo-calcio, paresias postparto, infertilidad, desarrollo retardado y baja productividad.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos adultos: administrar 10 a 15 ml.
Becerras: administrar 5 ml.
Ovinos y caprinos: administrar 2 a 5 ml.
Puede aplicarse una segunda dosis a las 48 horas a recomendación del Médico Veterinario.
Vía de Administración: Intramuscular, intravenosa o subcutánea.



ADVERTENCIAS

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Consérvese a una temperatura máxima de 25°C.
- Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

MENU

REGRESAR



Reconstituyente arsenical con Vitamina B₁₂ en solución inyectable

NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN:
Frasco con 100 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:
Acetato arsinito sódico.....50 mg
Cianocobalamina (Vit B₁₂).....2.5 mcg
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

Solución arsenical enriquecida con cianocobalamina (Vitamina B₁₂), reconstituyente orgánico con acción hematopoyética; indicada como tratamiento de soporte en agotamiento, anemias, parasitosis, anorexia, periodos de convalecencia y la preparación de animales para exposición.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos (carne) y equinos: Administrar 10 ml.
Ovinos, caprinos y porcinos: Administrar 2 a 5 ml.
Cada 48 a 72 horas hasta completar 5 aplicaciones.
Vía de Administración: Intramuscular o subcutánea.



ADVERTENCIAS

- No utilizar este producto 10 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.
 - No se aplique por vía intravenosa. No se administre este producto a equinos destinados al consumo humano.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Consérvese a temperatura ambiente.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



MENU

REGRESAR



Estimulante de las funciones ruminales en polvo soluble

PRESENTACIÓN:

Caja con 40 sobres de 15 g cada uno.



FÓRMULA

Cada sobre de 15 g contienen:

Concentrado de microflora ruminal, natural cultivada.....7 g
Excipiente c.b.p.....15 g
Contiene mesófilos aerobios de 2 a 4,000,000 UFC/g



INDICACIONES

Está indicado para la corrección de las atonías ruminales en ganado bovino, ovino y caprino; indigestión postparto y posterior al tratamiento por timpanismo e intervenciones quirúrgicas.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ganado Bovino: 3 sobres el primer día, después un sobre diario hasta corregir la disfunción.

Becerras, Ovinos y Caprinos: 1 sobre diario.

Vía de Administración: Oral, disuelto en el agua de bebida mezclando el contenido de cada sobre en 50 a 100 ml de agua.



ADVERTENCIAS

- No exceder la dosis recomendada. Para uso exclusivo en rumiantes.
- Manténgase en un lugar fresco y seco.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

MENU

REGRESAR



Reconstituyente y estimulante de la función reproductiva en solución inyectable

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml y 250 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Selenito de Sodio.....10.95 mg

(equivalente a 5 mg de Selenio)

Vitamina E.....50 mg

Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

Para el tratamiento del síndrome de deficiencia de selenio y vitamina E y para mejorar la ganancia de peso en becerros recién destetados.

Para la enfermedad del músculo blanco y retención placentaria en ganado lechero. Para estimular las funciones reproductivas en ganado bovino (productores de carne y leche) y porcino.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos (productores de carne y leche):

1 a 2 ml/90 kg.

Sementales: 1 ml/100 kg.

Cerdas adultas: 1 ml/100 kg.

En dosis única.

El tratamiento puede repetirse a los 4 meses.

Vía de Administración: Intramuscular o subcutánea.



ADVERTENCIAS

- Periodo de retiro en carne: 30 días.
- No hay periodo de retiro en leche.
- El Selenio puede causar cuadros tóxicos cuando se aplica simultáneamente con dietas altas en este elemento.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Consérvese a temperatura ambiente.
- Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.
- Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

MENU

REGRESAR



Para la prevención y tratamiento de las afecciones causadas por la deficiencia de vitaminas A, D₃ y E, en solución inyectable

NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN:
Frasco con 500 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Vitamina A.....500,000 UI
Vitamina D₃.....50,000 UI
Vitamina E.....50 UI
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

En la prevención y tratamiento de las afecciones originadas por la deficiencia de vitaminas A, D₃ y E, durante épocas de sequía, condiciones nutricionales pobres, reproducción, crecimiento y la recuperación de enfermedades.

Su excipiente acuoso, ofrece una rápida biodisponibilidad de las vitaminas contenidas en la formulación.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Equinos: 2 a 3 ml

Bovinos (carne y leche): 3 a 6 ml

Ovinos y caprinos: 0.5 a 1 ml

Becerras: 1 ml

Porcinos: 0.5 a 2 ml

Una sola dosis previo al programa de reproducción antes de la desparasitación.

Vía de administración: Intramuscular o subcutánea.

Vitafluid® es hidromiscible, por lo tanto puede ser administrado por vía oral en el agua de bebida.



ADVERTENCIAS

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

GANANCIA DE PESO



GANANCIA DE
PESO



MENU

REGRESAR



Promotor de crecimiento y rendimiento, agonista beta-adrenérgico en polvo (premezcla)

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 5 kg.



FÓRMULA

Cada 1000 g contienen:

Clorhidrato de Zilpaterol.....48 g
Excipiente c.b.p.....1000 g



INDICACIONES

Se indica en ganado bovino en etapa de finalización en corral de engorda, para mejorar la eficiencia de la conversión alimenticia, la ganancia de peso, el rendimiento de la canal y reducir la acumulación de grasa de cobertura.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar continuamente, por 30 días, en la fase final de la engorda: 125 g de GROFACTOR® por tonelada de alimento (a 90 % de materia seca); lo que equivale a una dosis de 0.15 mg/kg en animales de 400 kg que consuman 10 kg de alimento diario.

Para el cálculo más preciso de la cantidad de Grofactor® a incluir en la dieta, se puede considerar el uso de la siguiente fórmula:

$$\frac{3,125}{\text{(constante)}} \times \text{Promedio de peso corporal (kg)} = \frac{\text{Gramos de GROFACTOR®}}{\text{Promedio de consumo de alimento (kg)}} \text{ por tonelada de alimento}$$

Vía de administración: Oral, mezclado en el alimento.



ADVERTENCIAS

- Evítese su ingestión, inhalación, y el contacto con piel y ojos. La sustancia activa de GROFACTOR® es el clorhidrato de zilpaterol, un potente agonista beta₂-adrenérgico. En caso de contacto accidental con los ojos, lave abundantemente con agua. En caso severo de ingestión o inhalación, consulte a un médico y muéstrela la fórmula del producto; en esos casos, puede ser útil un antagonista beta₂-adrenérgico, como el propranolol, bajo supervisión médica. GROFACTOR® tiene un excipiente anti-polvo, para reducir el riesgo de intoxicación por inhalación; sin embargo, durante su manejo, se recomienda utilizar equipo de protección (ropa exclusiva, guantes, mascarilla con filtro y gafas). La presencia de microtrazadores en GROFACTOR®, permite trazar el producto en los núcleos y alimentos, lo que facilita al usuario su manejo en el corral de engorda. Para un almacenamiento prolongado, hasta su caducidad, manténgase en un lugar fresco y seco, perfectamente cerrado a una temperatura máxima de 30 °C. En condiciones climáticas extremas (50°C y 90% de humedad), GROFACTOR® permanece estable al menos por 3 meses. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos, así como de personas no entrenadas para su manejo. Período de retiro: El tratamiento debe suspenderse, por lo menos, 72 horas (3 días) antes del sacrificio animal para consumo humano.
- Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO.
PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA.

GANANCIA DE PESO



MENU

REGRESAR



Anabólico no esteroide

PRESENTACIÓN:

Frasco con 50 ml y 250 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Zeranol 10 mg

Vehículo c.b.p.1 ml



INDICACIONES

Zeralon® está indicado en bovinos y ovinos como un promotor de la ganancia de peso, en animales de pastoreo, de corral de engorda y en animales de desecho.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos y ovinos: Aplicar 1 ml de Zeralon® por cada 50 kg de peso. Reaplicar cada 60 ó 90 días, de acuerdo al programa de engorda establecido. Debido a la talla de la especie ovina se incluye la siguiente tabla.

Vía de Administración: Subcutánea, exclusivamente.

Peso corporal	Dosis volumen	No. Dosis por frasco de 50ml
10 kg	0.2 ml	250
20 kg	0.4 ml	125
50 kg	1 ml	50



ADVERTENCIAS

- No se administre en animales destinados a la reproducción (vacas, borregas o sementales).
 - No se aplique en hembras gestantes o en lactación.
 - Consérvese a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - En casos raros se puede producir ligera inflamación en el punto de aplicación, este efecto es pasajero y no requiere tratamiento.
 - Período de retiro: el sacrificio de animales destinados al consumo humano debe esperar, por lo menos 28 días después de su aplicación.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA.
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO



MENU

REGRESAR



Anabólico no esterooidal y desparasitante
endeoctocida

PRESENTACIÓN:

Frasco con 50 ml y 250 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Ivermectina.....10 mg
Zeranol.....10 mg
Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

Zeramec® está indicado como inductor del crecimiento por su efecto anabólico no esteroide, además del tratamiento de nematodos gastrointestinales y pulmonares, garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) spp*, piojos y ácaros en bovinos (carne) y ovinos.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos (carne): Aplicar 1 ml de Zeramec® por cada 50 kg de peso (200 mcg x kg de peso).

Ovinos: Aplicar 1 ml de Zeramec® por cada 25 kg de peso (200 mcg x kg de peso).

Vía de Administración: subcutánea



ADVERTENCIAS

- No utilizar en animales destinados a la reproducción.
 - No administrar por vía endovenosa o intramuscular.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños.
 - No fumar ni comer durante la manipulación del producto.
 - Consérvese en su envase original, en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
 - Periodo de retiro: el sacrificio de animales destinados al consumo humano debe esperar, por lo menos 28 días después de su administración.
 - Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.
 - Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la ivermectina por lo cual los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados en forma segura enterrándolos o incinerándolos.
- PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA.

GANANCIA DE
PESO

Zeramec® Platinum

No. de Reg. Q-0042-358
USO VETERINARIO



MENU

REGRESAR



*Endectabólico con ivermectina de acción prolongada
en solución inyectable*

PRESENTACIÓN:

Frasco 200 ml.



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Ivermectina.....31.5 mg

Zeranol.....10 mg

Vehículo c.b.p.....1 ml



INDICACIONES

Se indica en bovinos (productores de carne) como promotor de la ganancia de peso por su efecto anabólico no esteroide, para el tratamiento y control prolongado de nematodos gastrointestinales y pulmonares, garrapatas del género *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*, piojos y ácaros en ganado en pastoreo o corral de engorda.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar 1 ml por cada 50 kg de peso (equivalente a 0.2mg/kg de zeranol y 630 µg/kg de ivermectina).

Vía de Administración: subcutánea exclusivamente.



ADVERTENCIAS

- No utilizar en animales destinados a la reproducción.
 - Agite el producto antes de usar para disminuir su viscosidad.
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Manténgase alejado de los alimentos y bebidas.
 - No administrar por vía intravenosa o intramuscular.
 - No se utilice en vacas en producción de leche para consumo humano.
 - Lavarse las manos después de manipular el producto.
 - Consérvese a temperatura ambiente, máximo 30 °C.
 - Periodo de retiro: El sacrificio de animales destinados al consumo humano debe esperar, por lo menos, 122 días después de su aplicación.
 - Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la ivermectina por lo cual los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados en forma segura enterrándolos o incinerándolos.
- PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA.



SUMMActive





MENU

REGRESAR



Solución inyectable Cipionato de Estradiol

PRESENTACIÓN:

Frasco con 50 ml.



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Cipionato de 17-β-estradiol.....100 mg
Vehículo c.b.p.100 ml



INDICACIONES

Formulación hormonal indicada para: corrección del anestro, tratamiento de cuerpos lúteos persistentes, piómetra, expulsión de placenta y fetos momificados retenidos.

En vacas y vaquillas se utiliza para sincronización de celo en programas de inseminación artificial a tiempo fijo.

En caninos además está indicado como terapia de reposición en hembras castradas que sufren de incontinencia urinaria, tratamiento de pseudo-preñez y para el tratamiento de la hipertrofia prostática.

En bovinos y caninos puede ser utilizado para provocar la interrupción de la gestación no deseada.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos (hembras):

Tratamiento del Anestro: 3 a 5 mg (3 a 5 ml).

Tratamiento de Piómetra, placenta retenida y expulsión de fetos momificados: 10 mg (10 ml).

Cuerpo lúteo persistente: 4 mg (4 ml).

Interrupción de la preñez: 4 a 8 mg (4 a 8 ml) aplicados en el 4° día del servicio o 20 mg (20 ml) aplicados entre el 4° a 7° mes

de gestación.

Sincronización de celo en IATF: 1 mg (1 ml), al momento de retirar el dispositivo y aplicar la prostaglandina.

Equinos (hembras): Anestro: 5 a 10 mg (5 a 10 ml).

Porcinos, ovinos y caprinos (hembras): Anestro: 0.5 a 1 mg (0.5 a 1 ml)

Caninos (hembras): Anestro: 0.5 a 1 mg (0.5 a 1 ml). Incontinencia urinaria: 0.5 a 1 mg (0.5 a 1 ml).

Pseudo-preñez: 0.5 a 1 mg (0.5 a 1 ml). Piómetra: 1 a 2 mg (1 a 2 ml). Hipertrofia prostática: 1 a 2 mg (1 a 2 ml). Interrupción de la preñez: 0.5 a 2 mg (0.5 a 2 ml).

Felinos (hembras): Anestro: 0.25 a 0.5 mg (0.25 a 0.5 ml).

Generalmente el producto se administra en dosis única.

Vía de Administración: Intramuscular



ADVERTENCIAS

- No utilizar en animales hipersensibles a los principios activos.
- No administrar a pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva.
- No administrar en animales afectados por neoplasias uterinas o mamarias.
- No debe aplicarse a vacas en producción de leche destinada a consumo humano. No tiene tiempo de retiro en carne.
- No administrar este producto a equinos destinados para consumo humano.
- AGITAR ANTES DE USAR/ respetar normas de asepsia.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Consérvese entre 4 y 30 °C, al resguardo de la luz solar directa

PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
CUANTIFICADA.

DibActive® 1200

DibActive® 600

No. de Reg. Q-0042-473
No. de Reg. Q-0042-474
USO VETERINARIO



MENU

REGRESAR

Dispositivo intravaginal impregnado de progesterona

PRESENTACIÓN:

DibActive® 1200, 10 dispositivos de 1200 mg de P4.
DibActive® 600, 10 dispositivos de 600 mg de P4.



FÓRMULA

Cada dispositivo DibActive® 600 intravaginal contiene: Progesterona (4-pregnano-3,20-diona micronizada).....0.6g
Excipiente c.b.p.....1 dispositivo
Cada dispositivo DibActive® 1200 intravaginal contiene: Progesterona (4-pregnano-3,20-diona) micronizada.....1.20g
Excipiente c.b.p.....1 dispositivo



INDICACIONES

Sincronización del estro en vacas y vaquillas.
Sincronización del estro y ovulación para programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF).



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

1 dispositivo por animal.
Sincronización del estro: Colocar el dispositivo el día 0 + 2 ml de EstroActive® (equivalente a 2 mg de Benzoato de Estradiol). Retirar el día 8, aplicar 2 ml de InducelActive® (equivalente a 150 µg de D+Cloprostenol).
Sincronización del estro y ovulación para IATF: Colocar el dispositivo el día 0 + 2 de EstroActive® (equivalente a 2 mg de Benzoato de Estradiol). Retirar el día 8, y administrar 2 ml de InducelActive® (equivalente a 150 µg de D+Cloprostenol) y el día 9 aplicar 1 ml de EstroActive® (equivalente a 1 mg de Benzoato de Estradiol), 24 horas post-retiro del dispositivo. Realizar la inseminación artificial a las 52-56

horas de retirado el dispositivo.

DibActive® 600 y 1200 solo podrá ser utilizado como sincronizador del estro y de la ovulación con el uso concomitante de EstroActive® (Benzoato de Estradiol) e InducelActive® (D+Cloprostenol) conforme a las dosis antes mencionadas.

Vía de administración: Intravaginal

Modo de uso

Utilizando guante de látex, tomar el dispositivo y colocarlo en el aplicador. Desinfectar en soluciones de cuaternarios de amonio al 0.5%, realizar higiene de la zona perivulvar y lubricar la vagina con lubricante obstétrico antes de la aplicación (sobre todo en vaquillas). Introducir cada dispositivo utilizando el aplicador reutilizable exclusivo DibActive®.



ADVERTENCIAS

- No requiere periodo de retiro para el consumo de carne y leche de los animales tratados.
 - No administrar en insuficiencia renal y/o hepática.
 - No administrar a animales con endometritis, vaginitis o vulvovaginitis.
 - No administrar en animales hipersensibles al principio activo y/o componentes del excipiente.
 - No utilizar en animales desnutridos, pre púberes, vacas gestantes ni antes de los 30 días posteriores al parto.
 - Desinfectar soportes y aplicador entre cada aplicación (cuaternarios de amonio al 0.5%).
 - Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Consérvese a temperatura ambiente al resguardo de la luz solar directa.
 - Los residuos de éste producto deberán desecharse de forma segura en lugares y/o contenedores establecidos para este fin conforme a la normativa vigente en SEMARNAT.
- PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA.

SUMMACTIVE



MENU

REGRESAR



Análogo del 17β estradiol en solución inyectable

PRESENTACIÓN:
Frasco con 50 ml.



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:
Benzoato de estradiol.....100 mg
Vehículo c.b.p.....100 ml



INDICACIONES

En bovinos para la expulsión de placenta retenida, piómetra, inducción y sincronización del celo.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Retención placentaria, piómetra, inducción y sincronización del celo de 1 a 2.5 mg por animal.
Vía de Administración: Intramuscular



ADVERTENCIAS

- No utilizar el producto en animales sensibles al principio activo.
 - No aplicar a bovinos afectados por insuficiencia cardiaca congestiva, neoplasias mamarias o uterinas.
 - No debe aplicarse a vacas en producción de leche destinada a consumo humano.
 - No tiene periodo de retiro en carne; ya que es improbable que los residuos resultantes del uso de esta sustancia como agente estimulador del cremiento de acuerdo con las buenas prácticas zootécnicas, represente un riesgo para la salud humana.
 - Consérvese a temperatura ambiente.
- *Para mayor información consulte al departamento técnico de Virbac México.
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA.

GonActive® eCG

No. de Reg. Q-0042-467
USO VETERINARIO



MENU

REGRESAR



Gonadotropina coriónica equina (eCG-PMSG) en solución inyectable, para la inducción y sincronización del celo e inducción de la ovulación.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 25 ml.



FÓRMULA

Cada frasco con liofilizado de 5000 UI contiene:

*PMSG.....5000 UI

*Gonadotropina sérica de yegua preñada

Diluyente estéril (solvente) c.b.p.....25 ml



INDICACIONES

Vacas (carne/leche) (eficiencia reproductiva): Inducción y sincronización del celo e inducción de la ovulación, anestro. Se utiliza en los programas de I.A. y de I.A.T.F. Se utiliza también para la superovulación en la transferencia de embriones.

Ovejas y cabras (carne/leche) (eficiencia reproductiva): Inducción y sincronización del celo e inducción de la ovulación, anestro.

Cerdas: Inducción y sincronización del celo e inducción de la ovulación, anestro. Yeguas: Inducción y sincronización del celo e inducción de la ovulación, anestro. Perras y gatas: Inducción de celo, anestro.

Conejas: Inducción y sincronización del celo.

Indicaciones generales, en todas las especies: se indica para inducción del estro y para sacar hembras del anestro.

En machos de las diferentes especies, GonActive® eCG estimula el desarrollo del tejido intersticial de los testículos y de las glándulas sexuales (vesículas seminales y próstata). También se utiliza para mejorar la calidad y cantidad de semen y la disfunción de la libido.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La determinación de la dosificación de Gonactive® eCG la tomará el profesional dedicado a la reproducción animal, de acuerdo a especie, raza, estado fisiológico, etc.

Vía de Administración: Intramuscular o subcutánea



ADVERTENCIAS

En los animales puede observarse una ligera tumefacción en el sitio de inyección que desaparece en breve lapso sin medicación alguna. En animales sensibilizados, cualquier producto inyectable puede producir en forma esporádica, reacciones alérgicas. Ante la presencia de síntomas como disnea, temblores, babeo, edema, utilizar adrenalina, corticoides y/o antihistamínicos según el criterio del Médico Veterinario.

• "Prohibido utilizar en equinos para consumo humano"

Antagonismo: Suero anti-eCG-PMSG.

• Tiempo de retiro: No posee tiempo de retiro en carne y leche.

• Conservación: Conservar en refrigeración entre 2°C y 8°C hasta su utilización.

• Una vez reconstituido el liofilizado conservar en refrigeración y al abrigo de la luz por un plazo no mayor a 7 días.

• Este producto debe aplicarse bajo prescripción y control del Médico Veterinario.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
CUANTIFICADA.

SUMMACTIVE



MENU

REGRESAR



Prostaglandina sintética en solución inyectable

PRESENTACIÓN:

Frasco con 20 ml.



FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

D-Cloprostenol.....0.0075 g
Vehículo c.b.p100 ml



INDICACIONES

En bovinos para la sincronización del celo. Por tratarse de un agente luteínico, provoca la regresión morfológica y funcional del cuerpo lúteo; de este modo se consigue que los animales manifiesten celo y ovulen entre los 2 a 5 días posteriores al tratamiento.

En porcinos indicado para la inducción y sincronización del parto.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos hembras: 2 ml por animal (equivalente a 0.150 mg de D-Cloprostenol).

Para sincronización del celo se puede utilizar alguno de los siguientes esquemas. En el caso de aplicar el esquema de sincronización ciega a tiempo fijo, se aplica cloprostenol a todos los animales con un intervalo a 11 días entre las aplicaciones y se inseminan todos los individuos entre 72 y 96 horas, después de la segunda inyección. Otra alternativa es detectar celo e inseminar después de la primera aplicación; aquellos animales que no manifiesten celo recibirán una segunda inyección a los 11 días del primer tratamiento y se inseminarán luego de la manifestación de celo.

Porcinos hembras: Administrar 1 ml (equivalente a 0.075 mg de D-Cloprostenol) el día anterior de la fecha probable de parto (nunca antes del día 113 de gestación).

Vía de Administración: Intramuscular



ADVERTENCIAS

- Verificar que el animal al que se desea administrar cloprostenol, no esté gestante, a menos que el objetivo sea terminar con la gestación.
- Las mujeres embarazadas y las personas con predisposición asmática no deben manipular el producto, puesto que pueden provocar abortos o episodios de broncoespasmo.
- Efectos colaterales que pueden presentarse: incremento de la temperatura corporal y salivación.
- El tiempo que se debe transcurrir entre el último día de tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano es de 24 horas y el destino de la leche industrialización o consumo humano, 24 horas.

• Conservar en lugar fresco y al abrigo de la luz solar directa.

PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA.



MENU

REGRESAR



Buserelina acetato en solución inyectable

PRESENTACIÓN:

Frasco con 25 ml y 50 ml.



FÓRMULA

Cada 100 ml de producto contiene: Buserelina acetato.....0.00042 g (equivalentes a 0.00040 g de buserelina)
Vehículo c.b.p.....100 ml



INDICACIONES

Hormona análoga sintética de GnRH, liberadora de FSH y LH. Inducción de la ovulación, tanto en caso de desórdenes ováricos (por ejemplo: quistes) como en programas de mejoramiento de los índices de concepción en las especies indicadas.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos (hembras): 2.5 a 5.0 ml equivalentes a 0.01 a 0.02 mg de buserelina.

Equinos (hembras): 10.0 ml equivalentes 0.04 mg de buserelina.

El intervalo entre dosis y duración del tratamiento es variable dependiendo de la patología a tratar, respuesta clínica o programa de inducción de la ovulación.

Administración intramuscular profunda, subcutánea o intravenosa.

En equinos usar preferentemente la vía intravenosa.



ADVERTENCIAS

Contraindicaciones y limitaciones de uso

- No usar en hembras preñadas.
- Verificar que el producto se encuentre dentro del periodo de validez declarado en la etiqueta.
- No administrar este producto a equinos destinados para consumo humano.
- Consérvese entre 4 y 35°C.
- Protegido de la luz solar directa.
- Respetar normas de asepsia.
- Agitar bien antes de usar.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **Tiempo de retiro**
Carne: Cero días.
Leche: Cero días.

PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
CUANTIFICADA.

|BI^oSEGURIDAD





MENU

REGRESAR



Cipermetrina, Insecticida-Acaricida, Polvo Humectable

PRESENTACIÓN:

Frasco de 1 Lb y caja con 50 sobres de 25 g.



FÓRMULA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL: Cipermetrina:
(±) Alfa-Ciano-3-fenoxibencil (±)-cis,trans 3- (2,2
diclorovinil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxilato
..... 21.29%
Equivalente a 212.9 g de I.A./kg
Emulsificantes, dispersantes, tensioactivo y
Vehículo..... 78.71%



INDICACIONES

ALFADEX® Polvo 21.29, es un insecticida acaricida en formulación polvo humectable para uso en bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, aves y perros, así como en instalaciones pecuarias. Está indicado para el control de infestaciones de ectoparásitos en los animales domésticos: piojos, pulgas, ácaros y garrapatas únicamente de los géneros *Rhipicephalus spp*, *Dermacentor spp*, *Ixodes spp* y *Anocentor spp*. Así mismo, para el control en las instalaciones pecuarias de los ectoparásitos, insectos voladores e insectos rastrosos. Para obtener mejores resultados se deben tratar también las instalaciones o camas de los animales.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Realizar una premezcla de 5g o 10 g por litro de agua de ALFADEX® Polvo 21.29, en un litro de agua. Incorporar en los 29 litros restantes agitando hasta lograr una suspensión uniforme y aplicar por aspersión o baño de inmersión. Utilizar toda la mezcla el mismo día.

Aspersión: asperje contra pelo o en dirección contraria a la inserción del cañón de la pluma, con una bomba de aspersión manual o motorizada, que tenga la suficiente presión para alcanzar la piel. La cantidad de la mezcla a utilizar dependerá del tamaño del animal. De manera general un animal de 500 kg de peso corporal necesitará 5 litros de la mezcla, mientras que uno de 2 kg necesitará 250 ml.

Baño de inmersión: sumerja totalmente por unos segundos

el cuerpo del animal, teniendo especial cuidado en la cabeza, cerciorándose que el pelaje o plumaje queden totalmente empapados.

Intervalo de tratamiento: 3-4 semanas dependiendo del grado de infestación.

Para obtener mejores resultados se deben tratar también las instalaciones o camas de los animales.

Instalaciones pecuarias: Realizar una premezcla en un litro de agua. Mezclar la dosis en la cantidad necesaria de agua, agitando hasta lograr una suspensión uniforme. Mantener la mezcla en agitación durante la aplicación. La mezcla se debe aplicar por aspersión gruesa. Un litro de la mezcla rinde para 33 m2 de superficie a tratar. Aplique Alfedex® Polvo 21.29 en todas las superficies, grietas, rendijas y puntos clave donde se posan, transitan o esconden las plagas, tales como: camas, paredes, techos, vigas, tubos, cobertizos, rincones, esquinas, grietas y sitios donde se congrega la basura. Inspeccione cuidadosamente los sitios donde proliferan los insectos o los lugares por los que entran a las instalaciones.



ADVERTENCIAS

- Utilice equipo de protección adecuado durante el manejo y aplicación del producto: overol o camisa de manga larga y pantalón largo, guantes, mascarilla, protección para ojos y botas. • Al momento de la aplicación cuide la presencia de personal no autorizado, niños o animales.

- Evite la inhalación de la aspersión. Al aplicar el producto cuide la dirección del viento y NO asperje en contra del viento. • Descontamine el equipo de aplicación con detergente y una solución alcalina. Después de la jornada de trabajo, báñese y use ropa limpia.

NO TIENE PERIODO DE RETIRO PARA LECHE, CARNE Y HUEVO.

USO VETERINARIO

USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES PECUARIAS

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO



MENU

REGRESAR



Cipermetrina, Insecticida-Acaricida,
Concentrado emulsionable

PRESENTACIÓN:

Frasco de 1 L y 100 ml



FÓRMULA

Cipermetrina:

(RS)-ALFA-ciano-3-fenoxibencil (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) 3-
(2,2 diclorovinil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxilato
.....21.12%

(Equivalente a 200 g de I.A./ L a 20°C)

Ingredientes inertes78.88%

sinergista, emulsificante y disolvente

Total100.00%



INDICACIONES

ALFADEX® CE 21.12, está formulado con cipermetrina que es un piretroide sintético. Es un insecticida de amplio espectro de actividad contra plagas de Salud Pública. Puede utilizarse dentro y alrededor de las instalaciones, estructuras y medios de transporte. Se recomienda mantener las áreas tratadas libres de basura, chatarra y desechos en general.

Para tratamiento de termitas y otros insectos subterráneos: aplicar 10 ml de producto por litro de agua (se recomienda el uso de un litro de agua por cada 25 m²). Aplique la emulsión inyectando y/o mediante zanjas alrededor de las estructuras.



ADVERTENCIAS

- No permitas el acceso de los niños y mascotas al área tratada si la aspersión aún no se ha secado.
- No aplicar sobre alimentos o trastos que lo contengan; o utensilios de cocina. La mezcla preparada con las dosis aquí recomendadas no deberá aplicarse al follaje de plantas.

APLICACIÓN URBANA



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

ALFADEX® CE 21.12, en un litro de agua. Incorporar que están indicadas en la siguiente tabla, son para 10 litros de agua. Esta cantidad de mezcla alcanza para cubrir una superficie de aproximadamente 250 m².

PLAGAS INSECTOS VOLADORES	NOMBRE CIENTÍFICO	TIPO DE CONTROL	DOSIS/10 L DE AGUA
Mosca casera Mosquito vector de la fiebre amarilla Mosquito vector de la filaria	Musca domestica Aedes aegypti Culex pipiens, Culex quinquefasciatus Anopheles stepensi Glossinaspp.	Inicial (Infestación Severa)	100 mL
Mosquito vector de la Malaria Mosca tsetsé (vector del mal del sueño) Mosca de los establos Avispa	Stomoxys calcitrans Vespula sp.	Rutina (Infestación Leve)	50 mL
PLAGAS INSECTOS RASTREROS			
Cucaracha americana Cucaracha oriental Cucaracha alemana Chinche del asbesto Chinches	Periplaneta americana Blatta orientalis Blattella germanica Thermobia domestica Triatoma infestans	Cimex vectularis Xenopsylla cheopsis Ctenocephalides felis Monomorium pharaonis Solenopsis sp. Lycosa spp.	Inicial (Infestación Severa)
Pulga de la peste Pulga común Hormiga faraón Hormigas rojas Arañas Alacrán	Centruroides noxius; Centruroides suffusus; Centruroides limpidus. Triatoma infestans, T. dimidiata, T. brasiliensis, Panstrongylus mequistus, Rhodnius Prolixus.	Rutina (Infestación Leve)	50 mL

Avant Tapete ULTRA

No. de Reg. Q-0042-451
USO VETERINARIO

MENU

REGRESAR



Solución desinfectante de amplio espectro

PRESENTACIÓN:

Bidón de 20 L



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Cloruro de n-alkil bencil amonio.....	3.50 g
Cloruro de n-octil-decil-dimetil amonio.....	3.00 g
Cloruro de di-n-octil dimetil amonio.....	1.75 g
Cloruro de di-n-decil-dimetil amonio.....	1.75 g
Vehículo c.b.p.	100.00 ml



INDICACIONES

Desinfectante líquido de amplio espectro a base de cuaternarios de amonio de quinta generación contra bacterias, virus y hongos. Muy efectivo en aguas duras y amplia tolerancia a la materia orgánica puede ser usado en material y equipo pecuario.

Para la desinfección en incubadoras, áreas de recepción de huevo, charolas, carros, tarimas, área de polluelos, casetas, pisos, paredes, techos, comederos, bebederos y transporte de aves. Para desinfección en área porcícola, como bebederos, comederos, transporte, maternidades, producción, pisos, paredes y techos.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Use el producto 1:500 (un litro de Avant Tapete ULTRA por 500 litros de agua) para las instalaciones antes mencionadas. Se recomienda para áreas muy sucias o inicio del uso del producto una dilución de 1:250 (un litro de Avant Tapete ULTRA por 250 litros de agua) durante 15 días y posteriormente 1:500 o 1:1000 dependiendo el área a tratar.

Para arcos sanitarios use una dilución de 1:1000 (un litro del producto en 1000 litros de agua).

Use el producto de acuerdo a su sistema de limpieza, procure que el área a desinfectar sea cubierta completamente por el producto, retire el exceso con jalador o deje secar.

Vía de administración: diluido en agua.



ADVERTENCIAS

- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. En caso de ingestión beba inmediatamente leche, huevo o gelatina en solución o en su defecto abundante agua, evite tomar alcohol y Consulte de inmediato a su médico. Use guantes de hule y protector de ojos cuando maneje el producto. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por lo menos 15 minutos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

BIOSEGURIDAD



MENU

REGRESAR



Solución desinfectante y desengrasante

PRESENTACIÓN:

Bidón de 20 L



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Cloruro de n-alkil bencil amonio.....	4.00 g
Cloruro de n-octil-decil-dimetil amonio.....	2.00 g
Cloruro de di-n-octil-dimetil amonio.....	2.00 g
Cloruro de di-n-decil-dimetil amonio.....	2.00 g
Vehículo c.b.p.	100.00 ml



INDICACIONES

Desinfectante y desengrasante líquido de amplio espectro a base de cuaternarios de amonio de quinta generación contra bacterias, virus y hongos. Muy efectivo en aguas duras y amplia tolerancia a la materia orgánica; puede ser usado en material y equipo pecuario. Para la desinfección, limpieza y desengrasado en incubadoras, áreas de recepción de huevo, charolas, carros, tarimas, área de polluelos, casetas, pisos, paredes, techos, comederos, bebederos y transporte de aves. Para la desinfección, limpieza y desengrasado en área porcícola como: bebederos, comederos, transporte maternidades, producción, pisos, paredes y techos.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Use el producto 1:100 (un litro de Avant ULTRA 5 por 100 litros de agua) para las instalaciones antes mencionadas; se recomienda para áreas muy sucias o inicio del uso del producto una dilución de 1:50 (un litro de Avant ULTRA 5 por 50 litros de agua) durante 15 días y posteriormente 1:100 o 1:200 dependiendo del área a tratar.

Use el producto de acuerdo a sus sistema de limpieza, procure que el área a desinfectar sea cubierta completamente por el producto, retire el exceso con jalador o deje secar.



ADVERTENCIAS

- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. En caso de ingestión consulte de inmediato a su Médico. Use guantes de hule y protector de ojos cuando maneje el producto.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por lo menos 10 minutos. • No use equipo corrosible para la preparación de la solución. Como se presenta espumeo en la recirculación del producto en el equipo de ordeña, se debe tener cuidado con el compresor, por lo que se recomienda supervisión continua.
- Use el producto de acuerdo a sus sistema de limpieza, procure que el área a desinfectar sea cubierta completamente por el producto, retire el exceso con jalador o deje secar. Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO



MENU

REGRESAR



Desinfectante de amplio espectro en solución

PRESENTACIÓN:

Bidón de 20 L



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Cloruro de n-alquil dimetil bencil amonio.....	4.50%
Cloruro de n-octi-decil-dimetil amonio.....	3.50%
Cloruro de di-n-decil-dimetil amonio.....	1.50%
Cloruro de di-n-decil-dimetil amonio.....	2.50%
Glutaraldehído.....	10.00%
Vehículo c.b.p.	100.00%



INDICACIONES

Avanzar es un desinfectante de amplio espectro de uso pecuario a base de cuaternarios de amonio de quinta generación y glutaraldehído (bactericida, viricida y fungicida) formulado para la desinfección de instalaciones, equipo y mobiliario, eliminando virus, bacterias y hongos. **Avanzar** puede ser aplicado en cualquier superficie inerte como pisos, paredes, pasillos, jaulas, equipo, utensilios y mesas de trabajo. Se recomienda el uso de **Avanzar** en incubadoras, granjas avícolas, granjas porcícolas (salas de maternidad), ranchos ganaderos, laboratorios microbiológicos.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Para desinfectar prepare una dilución de 1:750 a 1:1000 dependiendo del área a desinfectar. Aplique esta solución con aspersor, nebulizador o equipo automático de alta presión para que el producto cubra y humedezca perfectamente la superficie o equipo a sanitizar. Antes de aplicar **Avanzar** deberá llevar a cabo una limpieza profunda en el área a tratar.



ADVERTENCIAS

- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. En caso de ingestión beba inmediatamente leche, huevo o gelatina en solución o en su defecto abundante agua. En caso de contacto con piel y ojos enjuague con abundante agua. Consulte de inmediato a su médico.
 - Eliminar los envases vacíos o con contenido residual según las normas ambientales vigentes.
- AGÍTESE ANTES DE USARSE
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Shampoo Germicida Avant

MENU

REGRESAR



Jabón líquido para manos y cuerpo

PRESENTACIÓN:

Bidón de 25



FÓRMULA

Cada 100% contiene:

Clorógenos.....	0.75 %
Tensoactivo Aniónico.....	30.00 %
Emulsificantes, Humectantes c.b.p.....	100 %



INDICACIONES

Shampoo Germicida Avant es un jabón líquido, biodegradable, no tóxico, inocuo para la piel, no mutagénico, ni carcinogénico.



MODO DE USO

Aplique el Shampoo en forma directa y abundante sobre el cabello y cuerpo húmedo, así como en las manos, antes, durante y después de los manejos operacionales del personal. Facilite su aplicación en el cuerpo utilizando una esponja, estropajo o cepillo antes y después de las operaciones en las áreas de proceso de la industria alimenticia. Permita que el **Shampoo Germicida Avant** permanezca en contacto 30 segundos y posteriormente enjuague.




ADVERTENCIAS

- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua. Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.


ACTIVA tus vacas



Protocolo Parto Vigoroso y Puerperio Sano



Protocolo de Impulso Reproductivo




MENU


ACTIVA tus vacas



Protocolo de IATF con resincronización precoz para doble IATF en vacas de carne




Protocolo Presynch 14/10 y Ovsynch 56 en ganado lechero especializado



MENU

Protocolo Reproducción Total



No. de Reg. Q-0042-466, 249,474, 473, 461, 459, 476, 460, 467, B-0042-040

MENU



Estamos comprometidos a cambiar el mundo, hacerlo mejor.
Porque una acción lo cambia todo.

