

OBJETIVOS

- > Limitar el impacto de un estrés biótico
- > Asegurar el inicio y el final del lote
- > Mantener el rendimiento durante los periodos de riesgo

POSICIONAMIENTO

- > En el caso de brote biótico en particular:
 - Al inicio durante los brotes de *E. coli* para mejorar el crecimiento y la homogeneidad
 - En presencia de *Enterococcus* durante los trastornos locomotores al final del lote



UNA COMBINACIÓN DE 3 ACCIONES



SIN RESIDUOS / SIN PERIODO DE RETIRO

ADITIVO FITOGÉNICO 100% NATURAL

MEJORA EL RENDIMIENTO ZOOTÉCNICO

Composición: activos fitógenos a base de *Harpagophytum procumbens*, *Laurus nobilis*, *Origanum heracleoticum*, *Ribes nigrum*

* Para saber qué formas/versiones de este producto pueden utilizarse en agricultura ecológica, póngase en contacto con Biodevas Laboratoires.

INSTRUCCIONES DE USO

	Pollos de engorde Pavo	Desde la llegada de los animales (1er día de edad): 0,5 mL/L durante 5 días Entonces durante los periodos de riesgo al final del lote (en caso de síntomas de cojera alrededor de los 18-20 días de edad): 0,5 mL/L durante 3 días Durante un estrés biótico: 0,5 mL/L durante 5 días
	Aves ponedoras	A la llegada de las pollitas: 0,5 mL/L durante 5 días Durante un estrés biótico: 0,5 mL/L durante 5 días