

LIVACOX® Q

Vacuna para estimular la inmunidad contra la Coccidiosis Aviar en aves de reemplazo, reproductoras pesadas, ligeras y ponedoras comerciales.



FORMULA

Cada mL contiene:

de 30 a 50 mil oocistos atenuados de cada una de las siguientes líneas: *Eimeria acervulina*, *Eimeria máxima*, *Eimeria tenella* Y 10 mil oocistos de *Eimeria necatrix*, Cloramina al 1%



INDICACIONES

Tipo de Ave:

La vacuna está recomendada para aves de reemplazo reproductoras ligeras, pesadas y ponedoras comerciales de un día hasta 7 días de edad.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Para ser aplicada por métodos masivos.



MÉTODOS MASIVOS

Aspersión

- Abra o mezcle la vacuna hasta el momento de la vacunación.
- Añada entre 2 – 2.5 ml de colorante rojo por cada litro de la solución vacunal.
- Utilice el equipo de aspersión Spra Vac® C para aplicación al día de edad en la planta de incubación o Field Spra Vac® para aplicación en granja. (*solicite el manual del equipo*).
- Siga las instrucciones de uso del equipo proporcionadas por Boehringer Ingelheim.



Agua de bebida

- Abra o mezcle la vacuna hasta el momento de la vacunación.
- Elimine la administración de medicamentos o desinfectantes en el agua de bebida por lo menos 72 horas antes de la vacunación.



ALMACENAMIENTO:

Mantener en refrigeración entre 2 a 7 °C.



PRESENTACIÓN

Frasco de 5,000 dosis.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO

Elaborado en U.S.A por: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
Importado y distribuido por: Boehringer Ingelheim Animal Health México, S.A. de C.V.